



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
●空容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

*本印刷物は2022年6月22日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

 **三井化学アグロ株式会社**
東京都中央区日本橋1-19-1日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <https://www.mitsui-agro.com/>

DR01000C



 **三井化学アグロ株式会社**

産業用無人航空機用農薬

ラインアップ



水稻

●除草剤

・直播水稻用

薬剤名	使用量/10a	使用時期
アールタイプ/シュナイデン1キログラム	1kg	稲1葉期～ノビエ2.5葉期、但し収穫90日前まで
アールタイプ/シュナイデンフロアブル	500mℓ	稲1葉期～ノビエ2.5葉期、但し収穫90日前まで
アルファプロ1キログラム75	1kg	稲1葉期～ノビエ2.5葉期、但し収穫90日前まで
アルファプロ豆つぶ250	250g	稲1葉期～ノビエ2.5葉期、但し収穫90日前まで
イネキング1キログラム	1kg	稲1葉期～ノビエ2.5葉期、但し収穫90日前まで
イネキングフロアブル	500mℓ	稲1葉期～ノビエ2.5葉期、但し収穫90日前まで
ウルティモZ1キログラム	1kg	稲1葉期～ノビエ3.5葉期、但し収穫90日前まで
ウルティモZフロアブル	500mℓ	稲1葉期～ノビエ3.5葉期、但し収穫90日前まで
オシオキMX1キログラム	1kg	稲3葉期～ノビエ3.5葉期、但し収穫45日前まで
キクンジャーZ1キログラム	1kg	稲1葉期～ノビエ3葉期、但し収穫90日前まで
クサウエボン1キログラム	1kg	は種直後～ノビエ3.5葉期、但し収穫90日前まで
クサウエボンフロアブル	500mℓ	稲1葉期～ノビエ3.5葉期、但し収穫90日前まで
クサトリ-BSX1キログラム51	1kg	稲1葉期～ノビエ2.5葉期、但し収穫90日前まで
シアゲMF1キログラム	1kg	稲3.5葉期～ノビエ4.5葉期、但し収穫60日前まで
ジェインソウル1キログラム	1kg	稲1葉期～ノビエ2.5葉期、但し収穫90日前まで
ジェインソウルフロアブル	500mℓ	稲1葉期～ノビエ2.5葉期、但し収穫90日前まで
ジカマック500グラム粒剤	500g	は種直後～ノビエ1.5葉期、但し収穫90日前まで
ジャスタ1キログラム	1kg	は種直後～ノビエ3.5葉期、但し収穫90日前まで
ジャスタフロアブル	500mℓ	稲1葉期～ノビエ3.5葉期、但し収穫90日前まで
トドメMF1キログラム	1kg	稲3.5葉期～ノビエ4葉期、但し収穫50日前まで
バイスコープ1キログラム	1kg	稲3葉期～出芽後50日、但し収穫45日前まで
フォローアップ1キログラム	1kg	稲3葉期～ノビエ5葉期、但し収穫60日前まで
ルナクロス1キログラム	1kg	稲3葉期～出芽後50日、但し収穫45日前まで

・移植水稻用(初期除草剤)

薬剤名	使用量/10a	使用時期
スウィープフロアブル	500mℓ	植代後～移植前7日又は移植直後～ノビエ1葉期、但し移植後30日まで

・移植水稻用(初・中期～発処理剤)

薬剤名	使用量/10a	使用時期
アールタイプ/シュナイデン1キログラム	1kg	移植直後～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで
アールタイプ/シュナイデンフロアブル	500mℓ	移植後3日～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで
アルファプロ1キログラム75	1kg	移植後3日～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで
アルファプロ豆つぶ250	250g	移植後3日～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで
アルファプロ豆つぶ250	250g	移植後3日～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで
イネキング1キログラム	1kg	移植直後～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで
イネキングフロアブル	500mℓ	移植直後～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで
ウルティモZ1キログラム	1kg	移植直後～ノビエ3.5葉期、但し移植後30日まで
ウルティモZフロアブル	500mℓ	移植後5日～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで
キクンジャーZ1キログラム	1kg	移植直後～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで
キクンジャーZフロアブル	500mℓ	移植後5日～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで
クサウエボン1キログラム	1kg	移植直後～ノビエ3.5葉期、但し移植後30日まで
クサウエボンフロアブル	500mℓ	移植直後～ノビエ3.5葉期、但し移植後30日まで
クサトリ-BSX1キログラム51	1kg	移植直後～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで
ジェインソウル1キログラム	1kg	移植直後～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで
ジェインソウルフロアブル	500mℓ	移植直後～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで
ジャスタ1キログラム	1kg	移植直後～ノビエ3.5葉期、但し移植後30日まで
ジャスタフロアブル	500mℓ	移植直後～ノビエ3.5葉期、但し移植後30日まで

・移植水稻用(中期除草剤、中・後期除草剤)

薬剤名	使用量/10a	使用時期
オシオキMX1キログラム	1kg	移植後14日～ノビエ4葉期、但し収穫45日前まで
シアゲMF1キログラム	1kg	移植後20日～ノビエ4.5葉期、但し収穫60日前まで
トドメMF1キログラム	1kg	移植後14日～ノビエ5葉期、但し収穫50日前まで
バイスコープ1キログラム	1kg	移植後14日～60日、但し収穫45日前まで
フォローアップ1キログラム	1kg	移植後15日～ノビエ5葉期(稲4葉期以降)、但し収穫60日前まで
ルナクロス1キログラム	1kg	移植後14日～60日、但し収穫45日前まで

その他の水稻除草剤の使用について

使用方法において、散布機器が指定されていない「散布」、「全面土壌散布」などとなっている農薬についても、その使用方法を始め、希釈倍率、使用量等を遵守できる範囲であれば、ドローンで使用可能です。例えば、使用量「1kg/10a」、使用方法「散布」の水稻除草剤について、「無人航空機による散布」の表示がなくても、使用量等を遵守できる範囲であれば、ドローンで使用可能です。

●殺虫剤・殺菌剤・殺虫殺菌剤

分類	薬剤名	希釈倍率	使用量/10a	適用病害虫	使用時期*	
殺虫剤	スクミンベイト3	-	2~4kg	スクミリンゴガイ	発生時	
	スタークルメイト液剤10	×8	0.8ℓ	ウンカ類、カメムシ類	7日	
		×16	1.6ℓ	ウンカ類、ツマグロヨコバイ		
		×30	3ℓ	ウンカ類		
	スタークルメイト1キログラム粒剤	-	1kg	ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類、イネミスゾウムシ、ニカメイチュウ	7日	
	トレボンエア	×8	0.8ℓ	コブノメイガ、イナゴ類、ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ、フタオビコヤガ	14日	
		×16	1.6ℓ	ヒメトビウンカ、カメムシ類		
		×8	0.8ℓ	ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ、コブノメイガ		
	殺菌剤	サンプラス1キログラム	-	1kg	いもち病、もみ枯細菌病	30日(出穂5日前)
		サンプラス粒剤18	-	500g	いもち病、もみ枯細菌病	30日(出穂5日前)
モンガリット1キログラム		-	1kg	紋枯病、稲こうじ病、墨黒穂病	45日	
殺虫殺菌剤		コラトップスタークル1キログラム	-	1kg	いもち病、ウンカ類、カメムシ類、ツマグロヨコバイ	出穂5日前

園芸

■畑作物

作物	薬剤名	希釈倍率	使用量/10a	適用病害虫	使用時期*
あすき	トレボンエア	×8	1.6ℓ	アズキノメイガ	14日
	スタークルメイト液剤10	×8	0.8ℓ	カメムシ類、ダイズサヤタマバエ、フタスジヒメハムシ	7日
えだまめ	トレボンエア	×8	0.8ℓ	ハスモンヨトウ、カメムシ類、マメシクイガ	14日
	プロフレアSC	×16~32	0.8~1.6ℓ	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ダイズサヤタマバエ、フタスジヒメハムシ	前日
	ベネビアOD	×32	1.6~2.4ℓ	アブラムシ類	前日
かんしょ	プロフレアSC	×16~32	0.8~1.6ℓ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ、ヨツモンカメノコハムシ	前日
	ベネビアOD	×40	1~2ℓ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ、アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、ヨツモンカメノコハムシ、ヒルガオハモグリガ	7日
小麦	トレボンエア	×8	0.8ℓ	ヒメトビウンカ	14日
	トレボンスカイMC	×16	0.8ℓ	アブラムシ類	14日
だいず	アデオ乳剤	×24	0.8ℓ	マメシクイガ、アブラムシ類	7日
	スタークルメイト液剤10	×8	0.8ℓ	カメムシ類、ダイズサヤタマバエ、フタスジヒメハムシ	7日
	トルネードエースDF	×8~16	0.8ℓ	ハスモンヨトウ	7日
	トレボンエア	×8	0.8ℓ	ハスモンヨトウ、カメムシ類、マメシクイガ	14日
	トレボンスカイMC	×8~16	0.8ℓ	ハスモンヨトウ、カメムシ類	14日
	×8	0.8ℓ	マメシクイガ		
	×16	1.6ℓ	マメシクイガ		
	トレボンスターフロアブル	×8	0.8ℓ	カメムシ類	14日
	ベネビアOD	×32	1.6~2.4ℓ	アブラムシ類	7日
	×8~2.4ℓ	ハスモンヨトウ、マメシクイガ			
ベルコートフロアブル	×6~12	1.6ℓ	紫斑病	7日	
ばれいしょ	トレボンエア	×8	1.6ℓ	アブラムシ類	7日
	ベネビアOD	×40	2~3.2ℓ	アブラムシ類、ハスモンヨトウ	7日
未成熟とうもろこし	ベネビアOD	×40	2~3.2ℓ	アワノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサトウ、ムギクビレアブラムシ	前日

■特用作物

作物	薬剤名	希釈倍率	使用量/10a	適用病害虫	使用時期*
さとうきび	サムコルフロアブル10	×50	2.4ℓ	イネトウ、ツマジロクサトウ	30日
	スタークルメイト液剤10	×14	2.4ℓ	カンジャコバ(ネガカメムシ、イナゴ類)	7日
てんさい	トレボンスカイMC	×16	1.6ℓ	ヨトウガ	14日

■野菜

作物	薬剤名	希釈倍率	使用量/10a	適用病害虫	使用時期*
アスパラガス	ベルコートフロアブル	×8	1.6ℓ	斑点病	7日
かぼちゃ	ベジセイバー	×16	1.6ℓ	うどんこ病、つる枯病、べと病	7日
	ベネビアOD	×20	1~2ℓ	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類	前日

作物	薬剤名	希釈倍率	使用量/10a	適用病害虫	使用時期*
キャベツ	スタークルメイト液剤10	×8~16	1.6ℓ	アブラムシ類	3日
	トルネードエースDF	×10	1~2ℓ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウバ、ハイマダラノメイガ、コナガ、アオムシ	7日
	トレボンエア	×8	1.6ℓ	アブラムシ類、ヨトウムシ、アオムシ	3日
	ベジセイバー	×16	1.6ℓ	べと病、株腐病、菌核病	14日
	ベネビアOD	×20	1~2ℓ	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、ウバハムシ、オオタバコガ、アザミウマ類、アブラムシ類	前日
しょうが	サンリット水和剤	×24	3.2ℓ	白星病	7日
	トルネードエースDF	×20	1~2ℓ	ハスモンヨトウ、アワノメイガ	7日
	トレボンエア	×8	1.6ℓ	アワノメイガ	7日
だいこん	スタークルメイト液剤10	×8~16	1.6ℓ	アブラムシ類	7日
	トレボンエア	×8	1.6ℓ	アブラムシ類、ヨトウムシ、アオムシ	21日
	ベネビアOD	×20	1~2ℓ	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ、ダイコンハムシ、アブラムシ類、ハモグリバエ類、キスジノハムシ、ヨトウムシ	前日
たまねぎ	ベジセイバー	×16	1.6ℓ	べと病、灰色かび病、灰色腐敗病、小菌核病	7日
	ベネビアOD	×20	1~2ℓ	シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類	14日
にんじん	ベルコートフロアブル	×8	2ℓ	斑点病	14日
にんにく	ベネビアOD	×20	1~2ℓ	アザミウマ類、ネギコガ	7日
ねぎ	スタークルメイト液剤10	×8~16	1.6ℓ	アザミウマ類	3日
	トルネードエースDF	×10	1~2ℓ	シロイチモジヨトウ	14日
	トレボンエア	×8	1.6ℓ	シロイチモジヨトウ	21日
	ベジセイバー	×16	1.6ℓ	べと病、さび病、白絹病、葉枯病、黒斑病、小菌核腐敗病	14日
	ベネビアOD	×20	1~2ℓ	シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、ハモグリバエ類	前日
はくさい	トルネードエースDF	×10	1~2ℓ	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ、シロイチモジヨトウ	7日
	スタークルメイト液剤10	×8~16	1.6ℓ	アブラムシ類	3日
ブロッコリー	トルネードエースDF	×20	1~2ℓ	コナガ、アオムシ	14日
	ベジセイバー	×16	1.6ℓ	菌核病、べと病、黒すす病	21日
	ベネビアOD	×20	1~2ℓ	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、アザミウマ類、アブラムシ類	前日
やまのいも	トレボンエア	×8	3.2ℓ	ヤマノイモコガ、アブラムシ類	14日
	ベネビアOD	×40	1~3ℓ	ナガイモコガ、ハスモンヨトウ、アブラムシ類	7日
	ベルコートフロアブル	×12	3ℓ	葉蒸病	7日
らっきょう	スタークルメイト液剤10	×8	1.6ℓ	アザミウマ類、ハモグリバエ類	前日
れんこん	スクミンベイト3	-	4kg	スクミリンゴガイ	発生時

■果樹

作物	薬剤名	希釈倍率	使用量/10a	適用病害虫	使用時期*
みかん	ベルコートフロアブル	×10	4ℓ	灰色かび病	3日
		5ℓ	貯蔵病害(青かび病、緑かび病)		
		×20	8ℓ	灰色かび病	
×20	10ℓ	貯蔵病害(青かび病、緑かび病)			

*収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数を示します。

※当該剤、有効成分の使用回数については、使用前にラベル等で別途ご確認ください。※ご使用の際は、ご購入先、弊社ホームページなどで最新の登録内容をご確認ください。