

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数
もも	せん孔細菌病	1000～2000 倍	200～700L/10a	収穫 60 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
すもも	黒斑病	1000 倍		収穫 30 日前まで			
イチワフルーツ	かいよう病	1000 倍 (200ppm)	—	収穫後から落葉前まで	1 回	樹幹注入	4 回以内 (樹幹注入は 1 回以内)
キャベツ	黒腐病	2000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
レタス	腐敗病				3 回以内		3 回以内
はくさい	軟腐病	1000～2000 倍		収穫 7 日前まで	5 回以内		5 回以内
たまねぎ		1000 倍			収穫 30 日前まで		6 回以内
こんにゃく	腐敗病						
ばれいしょ	軟腐病	1000～2000 倍		100～300L/10a	収穫 7 日前まで		5 回以内
	そうか病	10 倍	200～300mL /種いも 100kg	植付前	1 回	種いも散布	
		60～100 倍	—			5～10 秒間 種いも浸漬	
			2.5～3L /種いも 100kg			種いも散布	
	黒あし病	10 倍	300mL /種いも 100kg			5～10 秒間 種いも浸漬	
		60～100 倍	—			種いも散布	
			3L /種いも 100kg			種いも散布	

2025 年 1 月 29 日現在

作物名	使用目的	使用濃度	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ストレプトマイシンを 含む農薬の 総使用回数
ぶどう	無種子化	1000 倍 (200ppm)	200～ 700L/10a	満開予定日 の 14 日前 ～開花始期	1 回	散布	1 回
			30～ 100L/10a			花房散布	
			—	満開予定日 の 14 日前 ～満開期		花房浸漬	
						花房浸漬 (第 1 回目 ジベレリン処 理と併用)	