

2024 年 6 月 12 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスカマイシンを含む農薬の総使用回数	銅を含む農薬の総使用回数
かんきつ	かいよう病	1000 倍	200～700L/10a	収穫 7 日前まで	5 回以内	散布	5 回以内	—
なし	黒星病 花腐細菌病			収穫後 (10 月～11 月)	2 回以内		2 回以内	
もも	せん孔細菌病 縮葉病	500 倍		開花前まで	3 回以内		3 回以内	
びわ	灰斑病 がんしゅ病	1000 倍		幼果期まで				
キウイ フルーツ	かいよう病 花腐細菌病	500 倍		休眠期 発芽後叢生期 (新梢長約 10cm) まで	4 回以内		4 回以内 (樹幹注入 は 1 回以内)	
いんげんまめ	かさ枯病	1000 倍	100～300L/10a	収穫 30 日前 まで	3 回以内		3 回以内 (種子粉衣 は 1 回以内)	
あずき	褐斑細菌病 茎腐細菌病			収穫前日まで	5 回以内		5 回以内	
きゅうり	斑点細菌病 うどんこ病 べと病							
すいか	うどんこ病 褐斑細菌病 果実汚斑細菌病			収穫 3 日前 まで				
メロン	うどんこ病 斑点細菌病 果実汚斑細菌病			収穫前日まで				
トマト ミニトマト	葉かび病 輪紋病、疫病 斑点細菌病 かいよう病 軟腐病			収穫 7 日前 まで				
ピーマン とうがらし類	うどんこ病 斑点細菌病 斑点病			3 回以内	3 回以内			
キャベツ	黒腐病 軟腐病 黒斑細菌病			4 回以内	4 回以内			
セルリー	軟腐病 斑点病			2 回以内	2 回以内			
ブロッコリー	黒腐病			5 回以内	5 回以内			
だいこん	軟腐病 黒斑細菌病 ワッカ症			3 回以内	3 回以内			
ね ぎ	軟腐病			3 回以内	3 回以内			
たまねぎ				3 回以内	3 回以内			
ごぼう	黒斑細菌病			4 回以内	4 回以内			
レタス 非結球レタス	腐敗病 斑点細菌病							

2024 年 6 月 12 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カスカマインを含む農薬の総使用回数	銅を含む農薬の総使用回数				
なばな類	黒腐病	1000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内	—				
にんにく	春腐病			5 回以内	5 回以内							
ばれいしょ	軟腐病	500～800 倍		3 回以内	4 回以内(種いも浸漬は1回以内、植付後は3回以内)							
	疫病	800 倍										
てんさい	褐斑病	800～1000 倍		5 回以内	5 回以内							
	200 倍	25L/10a										
斑点病 斑点細菌病	800 倍	100～300L/10a		収穫開始7日前まで 収穫21日前まで	3 回以内		2 回以内					
	にんじん								黒葉枯病 軟腐病 斑点細菌病			
オクラ	葉枯細菌病											
メキャベツ	黒腐病											
茶	輪斑病 赤焼病								500～1000 倍	200～400L/10a	摘採14日前まで	2 回以内
	新梢枯死症 (輪斑病菌による) 褐色円星病 炭疽病											
ばら	うどんこ病		1000 倍						100～300L/10a	発病初期	6 回以内	6 回以内
ほおずき	軟腐病 斑点細菌病											
ゆり	軟腐病											
たばこ	疫病	100～180L/10a		収穫10日前まで	2 回以内		2 回以内					