

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロ ックスを含む 農薬の総 使用回数
稲		コブノメイガ	1000 倍	60～ 150L /10a	収穫 14 日前まで			
		ツマグロヨコバイ ウンカ類 イネドロオイムシ イナゴ類	1000～ 2000 倍					
		カメムシ類 イネミズゾウムシ	2000 倍					
きび		アカスジカスミカメ	1000 倍		収穫 14 日前まで	3 回以内	3 回以内	
あわ	アワヨトウ アワノメイガ							
ブロッコリー	アオムシ							
キャベツ		アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	1000～ 2000 倍		収穫 前日まで	3 回以内	3 回以内	
はくさい		収穫 3 日 前まで						
だいこん		収穫 7 日 前まで						
ねぎ		シロイチモジヨトウ			収穫 21 日前まで	2 回以内	2 回以内	
レタス		アブラムシ類			収穫 14 日前まで	3 回以内	3 回以内	
すいか	—	アブラムシ類 コナジラミ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ			収穫 3 日 前まで			
メロン		アブラムシ類 コナジラミ類	4 回以内	4 回以内				
なす		コナジラミ類	1000～ 2000 倍	100～ 300L /10a				
ピーマン		アブラムシ類						
オクラ		アブラムシ類 カメムシ類						
きゅうり		コナジラミ類 アブラムシ類	1000 倍		収穫前日 まで	3 回以内	3 回以内	
にがうり		アブラムシ類 ウリノメイガ カメムシ類 コナジラミ類 ヨトウムシ類						
かぼちゃ		ウリハムシ						
トマト		コナジラミ類						
さやえんどう 実えんどう		シロイチモジヨトウ ヨトウムシ ウラナミシジミ						2 回以内

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロ ックスを含む 農薬の総 使用回数	
さやいんげん	—	ワタアブラムシ ウラナミシジミ マメノメイガ	1000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内	
えだまめ		マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ウコンノメイガ ツメクサガ			収穫 14 日 前まで				
		ハスモンヨトウ			1000～ 2000 倍				
未成熟 ささげ		アブラムシ類	1000 倍	60～ 150L/ 10a	収穫前 日まで	1 回			1 回
うど					根株 養成期 但し、 収穫 45 日 前まで				
					アザミウマ類				
モロヘイヤ		コアオハナムグリ ケシキスイ類	1000～ 2000 倍	200～ 700L/ 10a	収穫前 日まで	3 回以内			3 回以内
かんきつ		ミカンハモグリガ							
		マンゴー							
麦類		ヒメトビウンカ アブラムシ類	2000 倍	60～ 150L/ 10a	収穫 14 日前まで	2 回以内			2 回以内
とうもろこし 飼料用 とうもろこし (子実)		アワノメイガ アワヨトウ ツマジロクサヨトウ	1000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫 7 日 前まで	4 回以内			4 回以内
ばれいしょ		アブラムシ類							
かんしょ		ナカジロシタバ アブラムシ類 ハスモンヨトウ							
		やまのいも やまのいも (むかご)							
さといも さといも (葉柄)		ハスモンヨトウ							

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロッ クスを含む 農薬の総 使用回数				
豆類 (種実、 ただし、 だいず、 あずきを 除く)	—	マメシクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ	1000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫 14 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内				
だいず		マメシクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ ウコンノメイガ ツメクサガ										
あずき		マメシクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ ノメイガ類										
しょうが 葉しょうが		ハスモンヨトウ							収穫 7 日 前まで	3 回以内	3 回以内	
ふき		コナジラミ類 フキノメイガ ヨトウムシ							収穫 14 日 前まで			
みつば		アブラムシ類							収穫 21 日前まで 但し、 伏せ込 み栽培 は伏せ 込み前ま で	2 回以内	2 回以内	
食用ぎく									2000 倍	収穫 3 日 前まで		

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロ ックスを含む 農薬の総 使用回数
せり (水耕栽培)	ガラス室等 の施設	アブラムシ類	1000 倍	100～ 150L /10a	収穫 30 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
せり	水田	オキナワイナゴモドキ			100～ 300L/ 10a			
みずいも		アブラムシ類	2000 倍	1000～ 2000 倍		収穫 30 日前まで		2 回以内
あしたば	ヨトウムシ	1000 倍	2000 倍		200～ 400L/ 10a			
てんさい	ホウキギツツミノガ	1000 倍		25～ 180L/ 10a		収穫 10 日前まで		6 回以内
ほうきぎ	チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ	2000 倍	1000～ 2000 倍		100～ 700L/ 10a			
茶	タバコガ ヨトウムシ	2000 倍		4000 倍		100～ 700L/ 10a		—
たばこ	アブラムシ類 タバコノミハムシ	1000～ 2000 倍	4000 倍		100～ 700L/ 10a			
樹木類 (つつじ類、 ポインセチ ア、ソテツを 除く)	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍		2000 倍		100～ 700L/ 10a		—
つつじ類	オビカレハ	2000 倍	4000 倍		100～ 700L/ 10a			
	ポインセチア	ツツジゲンバイ		2000 倍		4000 倍		100～ 700L/ 10a
ソテツ	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍	2000 倍	100～ 700L/ 10a	幼虫 発生期			
	宿根かすみ そう	オビカレハ				2000 倍		2000 倍
りんどう	クロマダラソテツジミ	2000～ 4000 倍	1000 倍	100～ 300L/ 10a	—	3 回以内		
きく カーネーション	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍						1000 倍
ゆり	オビカレハ	2000 倍	1000 倍	100～ 300L/ 10a	—	3 回以内		
トルコギキョウ	シロイチモジヨトウ	1000 倍						1000 倍
とうき 採種用とうき	ヨトウムシ	1000 倍	1000 倍	100～ 300L/ 10a	—	3 回以内		
せんきゅう	ヒラズハナアザミウマ	2000 倍						1000 倍
		アブラムシ類	2000 倍	1000 倍	100～ 300L/ 10a	—		
	ハスモンヨトウ	1000 倍	1000 倍				100～ 300L/ 10a	幼虫 発生期
	キアゲハ	1000 倍		1000 倍	100～ 300L/ 10a	—		
	ウリハムシモドキ	1000 倍	1000 倍				100～ 300L/ 10a	—
	ウリハムシモドキ	1000 倍		1000 倍	100～ 300L/ 10a	—		

2023 年 5 月 24 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロ ックスを含む 農薬の総 使用回数
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、 ススキ、セタ カアワダチソ ウ等の多 年生雑草 が優占し ている休 耕田	カメムシ類	2000 倍	60～ 150L/ 10a	—	3 回以内	散布	3 回以内
稲	—	ウンカ類	300～ 600 倍	25L /10a	収穫 14 日 前まで	3 回以内		3 回以内
		ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	300 倍					
		カメムシ類	600 倍					