

作物名	適用場所	適用病虫害名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロ ックスを含む 農薬の総 使用回数			
稲	—	コブノメイガ	1000 倍	60～ 150L /10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内			
		ツマグロヨコバイ ウンカ類 イネドロオイムシ イナゴ類	1000～ 2000 倍								
		カメムシ類 イネミズゾウムシ	2000 倍								
きび		アカスジカスミカメ	1000 倍	100～ 300L /10a	収穫 14 日前まで				3 回以内	2 回以内	
あわ		アワヨトウ アワノメイガ									
ブロッコリー		アオムシ									1000～ 2000 倍
キャベツ		アオムシ コナガ									
はくさい		ヨトウムシ									
だいこん		アブラムシ類									
ねぎ		シロイチモジヨトウ	1000 倍	100～ 300L /10a	収穫 14 日前まで 収穫 3 日 前まで				3 回以内	3 回以内	
レタス		アブラムシ類									
すいか		アブラムシ類 コナジラミ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ				1000 倍		100～ 300L /10a	収穫 3 日 前まで	4 回以内	4 回以内
メロン		アブラムシ類 コナジラミ類									
なす		コナジラミ類	1000～ 2000 倍	100～ 300L /10a	収穫前日 まで					3 回以内	3 回以内
ピーマン		アブラムシ類									
オクラ		アブラムシ類 カメムシ類	1000 倍	100～ 300L /10a	収穫前日 まで	3 回以内		3 回以内			
きゅうり		コナジラミ類 アブラムシ類									
にがうり		アブラムシ類 ウリノメイガ カメムシ類 コナジラミ類 ヨトウムシ類									
かぼちゃ		ウリハムシ									
トマト		コナジラミ類	1000 倍	100～ 300L /10a	収穫前日 まで	3 回以内		3 回以内			
さやえんどう 実えんどう	シロイチモジヨトウ ヨトウムシ ウラナミシジミ										

作物名	適用場所	適用病虫害名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロ ックスを含む 農薬の総 使用回数		
さやいんげん	ー	ワタアブラムシ ウラナミシジミ マメノメイガ	1000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内		
えだまめ		マメシクイガ シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ウコンノメイガ ツメクサガ			1000～ 2000 倍				収穫 14 日 前まで	
		ハスモンヨトウ								
未成熟 ささげ		アブラムシ類	1000 倍		収穫前 日まで				1 回	1 回
うど					根株 養成期 但し、 収穫 45 日 前まで					
					モロヘイヤ					
かんきつ				コアオハナムグリ ケシキスイ類	200～ 700L/ 10a	収穫前 日まで		3 回以内		
		ミカンハモグリガ	1000～ 2000 倍							
マンゴー		チャノキイロアザミウマ	1000 倍	収穫 7 日 前まで						
麦類		ヒメトビウンカ アブラムシ類	2000 倍	60～ 150L/ 10a	収穫 14 日前まで	2 回以内		2 回以内		
とうもろこし		アワノメイガ	1000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫 7 日 前まで	4 回以内		4 回以内		
飼料用 とうもろこし		アワヨトウ ツマジロクサヨトウ								
ばれいしょ		アブラムシ類								
かんしょ		ナカジロシタバ アブラムシ類 ハスモンヨトウ			収穫 14 日前まで	3 回以内		3 回以内		
		やまのいも やまのいも (むかご)							アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ	
さといも	ハスモンヨトウ	収穫 7 日 前まで								
さといも (葉柄)										

作物名	適用場所	適用病虫害名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロッ クスを含む 農薬の総 使用回数
豆類 (種実、 ただし、 だいず、 あずきを 除く)	—	マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ	1000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫 14 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内
だいず		マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ ウコンノメイガ ツメクサガ						
あずき		マメシンクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ ノメイガ類						
しょうが 葉しょうが		ハスモンヨトウ			収穫 7 日 前まで	3 回以内		3 回以内
ふき		コナジラミ類 フキノメイガ ヨトウムシ			収穫 14 日 前まで			
みつば		アブラムシ類	収穫 21 日前まで 但し、 伏せ込 み栽培 は伏せ 込み前ま で	2 回以内	2 回以内			
食用ぎく			2000 倍	収穫 3 日 前まで				

作物名	適用場所	適用病虫害名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロッ クスを含む 農薬の総 使用回数		
せり (水耕栽培)	ガラス室等 の施設	アブラムシ類	1000 倍	100～ 150L /10a	収穫 30 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内		
せり	水田	オキナワイナゴモドキ			収穫 14 日 前まで	3 回以内		3 回以内		
みずいも					収穫前 日まで	2 回以内		2 回以内		
じゅんさい	じゅんさい 田	マダラミズメイガ ジュンサイハムシ	2000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫前 日まで	2 回以内		2 回以内		
あしたば	—	アブラムシ類			収 穫 14 日前まで	3 回以内		3 回以内		
てんさい		ヨトウムシ			1000～ 2000 倍	収 穫 30 日前まで		2 回以内	2 回以内	
ほうきぎ		ハウキギツツミノガ			1000 倍	収 穫 45 日 前まで		4 回以内 (1 年間に 2回以内)	4 回以内 (1 年間に 2 回以内)	
おうぎ		ウリハムシモドキ	摘採 21 日 前まで	2 回以内		2 回以内				
茶		チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ	2000 倍	200～ 400L/ 10a	収 穫 10 日前まで	2 回以内		2 回以内		
たばこ		タバコガ ヨトウムシ	1000～ 2000 倍	25～ 180L/ 10a	幼虫 発生期				6 回以内	6 回以内
		アブラムシ類 タバコノミハムシ								
		樹木類 (つつじ類、 ポインセチ ア、ソテツを 除く)	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍	100～ 700L/ 10a	幼虫 発生期				
つつじ類		オビカレハ	2000 倍	—						
		ツツジグンバイ	2000 倍			幼虫 発生期				
		ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍	—						
オビカレハ		2000 倍	幼虫 発生期							
コナジラミ類		1000 倍		—						
ケムシ類 シャクトリムシ類		4000 倍	幼虫 発生期							
オビカレハ		2000 倍		—						
クロマダラソテツシジミ		2000～ 4000 倍	—							
ケムシ類 シャクトリムシ類		4000 倍		—						
オビカレハ		2000 倍	—							
シロイチモジヨトウ	1000 倍	100～ 300L/ 10a		—						
ヨトウムシ	2000 倍									
ヒラズハナアザミウマ	2000 倍									

2025 年 10 月 7 日現在

作物名	適用場所	適用病虫害名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロ ックスを含む農 薬の総使用 回数
きく カーネーション		アブラムシ類	2000 倍	100～ 300L/ 10a	発生 初期	6 回以内	散布	6 回以内
ゆり		ハスモンヨトウ	—					
トルコギキョウ			キアゲハ		12 回以内 (1 年間に 6 回以内)			
とうき								
採種用とうき								
せんきゅう						ウリハムシモドキ		3 回以内
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、ス スキ、セイタカ アワタチソウ 等の多年 生 雑 草 が 優 占 し て い る休耕田	カメムシ類	2000 倍	60～ 150L/ 10a	—	3 回以内	3 回以内	
稲	—	ウンカ類	300～ 600 倍	25L /10a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	3 回以内	
		ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	300 倍					
		カメムシ類	600 倍					