

作物名	適用場所	適用病虫害名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロッ クスを含む 農薬の総 使用回数				
稲	—	コブノメイガ	1000 倍	60～ 150L /10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内				
		ツマグロヨコバイ ウンカ類 イネドロオイムシ イナゴ類	1000～ 2000 倍									
		カメムシ類 イネミズゾウムシ	2000 倍									
きび		アカスジカスミカメ	1000 倍	100～ 300L /10a	収穫 14 日前まで				3 回以内	3 回以内		
あわ		アワヨトウ アワノメイガ										
ブロッコリー		アオムシ	1000～ 2000 倍		収穫 前日まで				2 回以内	2 回以内		
キャベツ		アオムシ コナガ			収穫 3 日 前まで							
はくさい		ヨトウムシ			収穫 7 日 前まで							
だいこん		アブラムシ類			収穫 21 日前まで							
ねぎ		シロイチモジヨトウ	1000 倍		収穫 14 日前まで				3 回以内	3 回以内		
レタス		アブラムシ類			4 回以内	4 回以内						
すいか		アブラムシ類 コナジラミ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ						3 回以内	3 回以内			
メロン		アブラムシ類 コナジラミ類			4 回以内	4 回以内						
なす		コナジラミ類	3 回以内					3 回以内				
ピーマン		アブラムシ類			1000 倍							
オクラ		アブラムシ類 カメムシ類				1000 倍						
きゅうり		コナジラミ類 アブラムシ類							1000 倍			
にがうり		アブラムシ類 ウリノメイガ カメムシ類 コナジラミ類 ヨトウムシ類								1000 倍		
かぼちゃ		ウリハムシ									1000 倍	
トマト		コナジラミ類										1000 倍
さやえんどう 実えんどう		シロイチモジヨトウ ヨトウムシ ウラナミシジミ										

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロ ックスを含む 農薬の総 使用回数	
さやいんげん	—	ワタアブラムシ ウラナミシジミ マメノメイガ	1000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内	
えだまめ		マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ウコンノメイガ ツメクサガ			1000～ 2000 倍				収穫 14 日 前まで
		ハスモンヨトウ							収穫前 日まで
未成熟 ささげ		アブラムシ類	1000 倍	根株 養成期 但し、 収穫 45 日 前まで	1 回	1 回			
うど				収穫 14 日前まで					
				モロヘイヤ	アザミウマ類	200～ 700L/ 10a		収穫前 日まで	3 回以内
かんきつ		コアオハナムグリ ケシキスイ類	1000～ 2000 倍	収穫 7 日 前まで					
		マンゴー	ミカンハモグリガ		2000 倍				
麦類		チャノキイロアザミウマ	1000 倍	60～ 150L/ 10a	収穫 14 日前まで	2 回以内		2 回以内	
		とうもろこし 飼料用 とうもろこし (子実)	ヒメトビウンカ アブラムシ類		2000 倍				100～ 300L/ 10a
ばれいしょ		アワノメイガ アワヨトウ ツマジロクサヨトウ	1000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫 14 日前まで	3 回以内		3 回以内	
かんしょ		アブラムシ類							
		ナカジロシタバ アブラムシ類 ハスモンヨトウ			収穫 14 日前まで				
やまのいも やまのいも (むかご)		アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ				収穫 7 日 前まで			
さといも		ハスモンヨトウ							
さといも (葉柄)									

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロッ クスを含む 農薬の総 使用回数
豆類 (種実、 ただし、 だいず、 あずきを 除く)	—	マメシクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ	1000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫 14 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内
だいず		マメシクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ アズキノメイガ ウコンノメイガ ツメクサガ						
あずき		マメシクイガ アブラムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ ウラナミシジミ ノメイガ類						
しょうが 葉しょうが		ハスモンヨトウ			収穫 7 日 前まで	3 回以内		3 回以内
ふき		コナジラミ類 フキノメイガ ヨトウムシ			収穫 14 日 前まで			
みつば		アブラムシ類	収穫 21 日前まで 但し、 伏せ込 み栽培 は伏せ 込み前ま で	2 回以内	2 回以内			
食用ぎく			2000 倍	収穫 3 日 前まで				

作物名	適用場所	適用病虫害名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロッ クスを含む 農薬の総 使用回数	
せり (水耕栽培)	ガラス室等 の施設	アブラムシ類	1000 倍	100～ 150L /10a	収穫 30 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内	
せり	水田	オキナワイナゴモドキ			収穫 14 日 前まで	3 回以内		3 回以内	
みずいも					収穫前 日前まで	2 回以内		2 回以内	
じゅんさい	じゅんさい 田	マダラミズメイガ ジュンサイハムシ	2000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫前 日前まで	2 回以内		2 回以内	
あしたば	—	アブラムシ類			2000 倍	収 穫 14 日前まで		3 回以内	3 回以内
てんさい		ヨトウムシ			1000～ 2000 倍	収 穫 30 日前まで		2 回以内	2 回以内
ほうきぎ		ホウキギツツミノガ			1000 倍	収 穫 45 日 前まで		4 回以内 (1 年間に 2回以内)	4 回以内 (1 年間に 2 回以内)
おうぎ		ウリハムシモドキ	摘採 21 日 前まで	2 回以内		2 回以内			
茶		チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ	2000 倍	25～ 180L/ 10a	2 回以内	2 回以内			
たばこ		タバコガ ヨトウムシ		25～ 180L/ 10a				収 穫 10 日前まで	
樹木類 (つつじ類、 ポインセチ ア、ソテツを 除く)		ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍	100～ 700L/ 10a	幼虫 発生期	6 回以内		6 回以内	
		オビカレハ	2000 倍				—		
つつじ類		ツツジグンバイ	2000 倍		幼虫 発生期				
		ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍				—		
	オビカレハ	2000 倍	—						
ポインセチア	コナジラミ類	1000 倍	幼虫 発生期						
	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍			—				
	オビカレハ	2000 倍							
ソテツ	クロマダラソテツシジミ	2000～ 4000 倍	幼虫 発生期						
	ケムシ類 シャクトリムシ類	4000 倍							
	オビカレハ	2000 倍							
宿根かすみ そう	シロイチモジヨトウ	1000 倍	100～ 300L/ 10a	—					
	ヨトウムシ	2000 倍							
りんどう	ヒラズハナアザミウマ								

作物名	適用場所	適用病虫害名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロ ックスを含む農 薬の総使用 回数				
きく カーネーション		アブラムシ類	2000 倍	100～ 300L/ 10a	発生 初期	6 回以内	散布	6 回以内				
ゆり		ハスモンヨトウ	—									
トルコギキョウ			キアゲハ		幼虫 発生期	12 回以内 (1 年間に 6 回以内)		12 回以内 (1 年間に 6 回以内)				
とうき												
採種用とうき									ウリハムシモドキ	収穫 14 日 前まで	3 回以内	3 回以内
せんきゅう												
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、ス スキ、セイタカ アワタチソウ 等の多年 生雑草が 優占してい る休耕田	カメムシ類	2000 倍	60～ 150L/ 10a	—	3 回以内	3 回以内					
稲	—	ウンカ類	300～ 600 倍	25L /10a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	3 回以内					
		ツマグロヨコバイ	300 倍									
		イネミズゾウムシ										
		イネドロオイムシ										
		カメムシ類	600 倍									