

2024 年 10 月 16 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	エトフェンプロ ックスを含む 農薬の 総使用回数		
稲	コブノメイガ	30 倍	3 L /10a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	空中散布	3 回以内		
	イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ コブノメイガ								
	麦類		2 回以内		2 回以内				
	とうもろこし 飼料用とうも ろこし (子実)		4 回以内		4 回以内				
	ばれいしょ								
ブロッコリー	アオムシ	8 倍	1.6 L /10a	収穫前日 まで	3 回以内	無人航空機 による散布	3 回以内		
キャベツ	アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ			収穫 3 日 前まで					
はくさい				収穫 7 日 前まで					
だいこん				収穫 21 日 前まで					
レタス				収穫 14 日 前まで					
ねぎ	シロイチモジヨトウ			収穫 21 日 前まで				2 回以内	2 回以内
だいず えだまめ	ハスモンヨトウ カメムシ類 マメシンクイガ ツメクサガ			0.8 L /10a					
あずき	アズキノメイガ			1.6 L /10a					
しょうが	アワノメイガ			3 回以内	3 回以内				
やまのいも	ヤマノイモコガ アブラムシ類			3.2 L /10a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	3 回以内		