

2023 年 5 月 24 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数			
稲	—	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イナゴ類 イネドロオイムシ カメムシ類 イネミズゾウムシ コブノメイガ	1000 倍	60～ 150L/ 10a	収穫 14 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内			
		ウンカ類 ツマグロヨコバイ	300 倍	25L/10a							
麦類		アブラムシ類	1000 倍	60～ 150L/ 10a	100～ 300L/ 10a	2 回以内			2 回以内		
とうもろこし 飼料用 とうもろこし (子実)		ツマジロクサヨトウ		収穫 7 日前 まで		4 回以内			4 回以内		
ばれいしょ やまのいも		アブラムシ類		3 回以内		3 回以内					
だいず えだまめ		マメシンクイガ ハスモンヨトウ カメムシ類 ツメクサガ		収穫 14 日前 まで		2 回以内			2 回以内		
さやえんどう 実えんどう		ウラナミシジミ シロイチモジヨトウ		収穫 前日 まで		3 回以内			3 回以内		
きゅうり		コナジラミ類 アブラムシ類		3 回以内							
すいか		アブラムシ類		収穫 3 日前 まで		4 回以内			4 回以内		
メロン				2 回以内		2 回以内					
トマト		コナジラミ類		収穫 前日 まで		3 回以内			3 回以内		
なす		コナジラミ類 アブラムシ類									
ブロッコリー		アオムシ		収穫 3 日前 まで		3 回以内			3 回以内		
キャベツ		アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ		収穫 7 日前 まで							
はくさい		シロイチモジヨトウ		収穫 21 日前 まで		2 回以内			2 回以内		
だいこん				2 回以内		2 回以内					
ねぎ											

2023 年 5 月 24 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	エトフェンプロク スを含む 農薬の 総使用回数		
レタス	—	アブラムシ類	1000 倍	100～ 300L/ 10a	収穫 14 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内		
てんさい		ヨトウムシ								
エンサイ		イモコガ								
うど		アブラムシ類	2000 倍		100～ 700L/ 10a	根株 養成期 但し、 収穫 45 日前まで		2 回以内	6 回以内	2 回以内
きく		シロイチモジヨトウ								
宿根かすみ そう										
たदैあい										
樹木類 (つつじ類、 いぬまきを 除く)		ケムシ類	1000 倍		発生初期	6 回以内		6 回以内		
つつじ類		ツツジゲンバイ								
いぬまき		モンアシブトゾウムシ ケブカトラカミキリ ケムシ類								
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、ス スキ、セイタカ アワダチソウ 等の多年 生雑草が 優占して いる休耕 田	カメムシ類	1000 倍	60～ 150L/ 10a	—	3 回以内	3 回以内			