2024 年 6 月 12 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽを含む農薬の総使用回数
稲		ウンカ類 ツマグロヨコバイ イナゴ類 イネドロオイムシ カメムシ類 イネミズゾウムシ コブノメイガ	1000 倍	60～150L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内		3 回以内
		ウンカ類 ツマグロヨコバイ	300 倍	25L/10a				
麦類		アブラムシ類		60～150L/10a		2 回以内		2 回以内
とうもろこし		ツマジロクサヨトウ アワヨトウ			収穫 7 日前まで	4 回以内		4 回以内
飼料用とうもろこし（子実）								
ばれいしょ		アブラムシ類				3 回以内		3 回以内
やまのいも					収穫 14 日前まで			
だいず えだまめ	―	マメシンクイガ ハスモンヨトウ カメムシ類 ツメクサガ				2 回以内	散布	2 回以内
さやえんどう 実えんどう		ウラナミシジミ シロイチモジヨトウ			収穫前日まで			
きゅうり		コナジラミ類 アブラムシ類	1000 倍			3 回以内		3 回以内
すいか		アブラムシ類		100～300L/10a	収穫 3 日前まで			
メロン						4 回以内		4 回以内
トマト		コナジラミ類			収穫前日まで	2 回以内		2 回以内
なす		コナジラミ類 アブラムシ類				3 回以内		3 回以内
ブロッコリー		アオムシ						
キャベツ		アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ			収穫 3 日前まで			
はくさい					収穫 7 日前まで			
だいこん					収穫 21 日前まで			
ねぎ		シロイチモジヨトウ				2 回以内		2 回以内

2024 年 6 月 12 日現在

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用場所</th><th>適用病害虫名</th><th>希釈倍数</th><th>使用液量</th><th>使用時期</th><th>本剤の使用回数</th><th>使用方法</th><th>ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽを含む農薬の総使用回数</th></tr>
<tr><td>レタス</td><td rowspan="12">－</td><td>アブラムシ類</td><td rowspan="6">1000 倍</td><td rowspan="6">100～300L/10a</td><td>収穫 14 日前まで</td><td>3 回以内</td><td rowspan="13">散布</td><td>3 回以内</td></tr>
<tr><td>てんさい</td><td>ヨトウムシ</td><td rowspan="3">2 回以内</td><td rowspan="3">2 回以内</td></tr>
<tr><td>エンサイ</td><td>イモコガ</td><td rowspan="2">根株養成期 但し、収穫 45 日前まで</td></tr>
<tr><td>うど</td><td>アブラムシ類</td></tr>
<tr><td>きく</td><td rowspan="3">シロイチモジヨトウ</td><td rowspan="3">－</td><td rowspan="7">6 回以内</td><td rowspan="7">6 回以内</td></tr>
<tr><td>宿根かすみそう</td></tr>
<tr><td>たであい</td><td>アブラムシ類
ハスモンヨトウ</td></tr>
<tr><td>樹木類（つつじ類、いぬまきを除く）</td><td>ケムシ類</td><td>2000 倍</td><td rowspan="4">100～700L/10a</td><td rowspan="4">発生初期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">つつじ類</td><td>ツツジグンバイ</td><td rowspan="2">1000 倍</td></tr>
<tr><td rowspan="2">いぬまき</td><td>モンアシブトゾウムシ</td></tr>
<tr><td>ケブカトラカミキリ
ケムシ類</td><td>2000 倍</td></tr>
<tr><td>水田作物、畑作物（休耕田）</td><td>ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田</td><td>カメムシ類</td><td>1000 倍</td><td>60～150L/10a</td><td>－</td><td>3 回以内</td><td>3 回以内</td></tr>
</table>