

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミルベメチンを含む農薬の総使用回数
りんご	ー	ハダニ類 キンモンホガ リンゴサビダニ ユキヤギアブラムシ	1000倍	200～ 700L /10a	収穫前日まで	1回		1回
もも		ハダニ類			収穫7日前まで			
ネクタリン		モモサビダニ						
小粒核果類 いちじく		ハダニ類	収穫前日まで					
なし			1000～ 1500倍					
おうとう		ニセサビダニ			収穫7日前まで			
パパイヤ								
かんしょ								
さといも			1000倍	100～ 300L /10a	収穫前日まで	2回 以内	散布	2回以内
やまのいも やまのいも(むかご)				100～ 500L /10a	収穫7日前まで			
だいず		ハダニ類	1500倍	100～ 300L /10a				
あずき				100～ 150L /10a	収穫14日前まで			
いんげんまめ 豆類(未成熟)			1500倍		収穫7日前まで 収穫前日まで			
いちご(親株床)			1000～ 1500倍		仮植前まで			
なす		ハダニ類 ハメグリハエ類 コナジラミ類 チャホコリダニ	1500倍	100～ 300L /10a	収穫前日まで			
トマト ミニトマト		ハメグリハエ類 トマトサビダニ コナジラミ類						
ピーマン	ハダニ類 コナジラミ類	1000倍						
	チャホコリダニ	1000～ 1500倍						

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミバメチンを含む農薬の総使用回数		
みょうが(茎葉)	—	ハダニ類	1000倍	100～400L/10a	みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合 にあつては開花期終了まで	2回以内	散布	2回以内		
しそ		ハダニ類 サビダニ類 チャノホリダニ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	1回		1回		
しそ科葉菜類 (えごま(葉)、しそを除く) しそ(花穂) さんしょう(葉) コリアンダー(葉) なんてん(葉)										
えごま(葉) 食用金魚草 食用なでしこ しよくようほおずき 食用ミニバラ		ハダニ類							2回以内	2回以内
食用プリムラ 食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんいちこう 食用トレニア 食用パンジー		シラメンホリダニ							1000倍	収穫7日前まで
せんぶり		ハモグリハエ類	1500倍	収穫前日まで	2回以内	2回以内				
きく(葉)		ハダニ類								
きく		ハダニ類	1000～1500倍	100～200L/10a	—	2回以内		2回以内		
宿根かすみそう		ハダニ類	1000～1500倍	100～200L/10a	—	2回以内		2回以内		