

2024 年 12 月 25 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イノキサジンを 含む農薬の総 使用回数
りんご	黒星病 斑点落葉病	1000～2000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	6 回以内 (但し、開花 期以降散布 は 3 回以内)	散布	8 回以内 (液剤及び水 和剤は合計 6 回以内(開 花期以降は 3 回以内)、 塗布剤は 2 回以内)
	うどんこ病 黄腐病	1000 倍					
	輪紋病、褐斑病 すす点病 すす斑病 黒点病	1000～1500 倍					
なし	黒斑病、黒星病 輪紋病 うどんこ病						
もも	黒星病			2000 倍	収穫前日 まで		3 回以内
	灰星病 ホモフシ腐敗病 うどんこ病 すすかび病 果実赤点病	1000～2000 倍					
おうとう	灰星病	1000 倍		収穫 7 日 前まで	3 回以内		
みかん	灰色かび病 そうか病	1000～2000 倍		収穫前日 まで			2 回以内
かんきつ (みかんを除く)	貯蔵病害 (緑かび病)	2000 倍					
かき	炭疽病、落葉病 うどんこ病 灰色かび病 すす点病 黒星病	1000～1500 倍		収穫 14 日 前まで	3 回以内		3 回以内
キウフルーツ	果実軟腐病 灰色かび病 貯蔵病害(灰色 かび病)	1000 倍		収穫前日 まで	5 回以内		5 回以内
小粒核果類 (うめ、すももを 除く)	黒星病、灰星病 灰色かび病 環紋葉枯病 すす斑病	2000 倍		収穫 30 日 前まで	3 回以内		3 回以内
うめ	黒星病、灰星病 灰色かび病 環紋葉枯病 すす斑病 枝枯病						
びわ	灰斑病 灰色かび病	1000 倍		4L/10a	収穫 7 日 前まで	無人航空機 による 散布	
		10 倍					

2024年12月25日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イノキサジンを含む農薬の総使用回数	
すもも	灰星病	1000～2000 倍	200～700 L/10a	収穫 3 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内	
マンゴー	炭疽病	1000 倍		収穫 14 日 前まで	2 回以内		2 回以内	
あけび (果実)	うどんこ病	3000 倍		収穫 14 日 前まで	2 回以内		2 回以内	
すいか	うどんこ病 つる枯病 菌核病、炭疽病	1000 倍	収穫前日 まで	4 回以内	4 回以内			
メロン	うどんこ病 つる枯病			5 回以内	5 回以内			
かぼちゃ	うどんこ病	1000～2000 倍	収穫 7 日 前まで	4 回以内	4 回以内			
きゅうり	うどんこ病 灰色かび病 炭疽病	2000～4000 倍	収穫前日 まで	7 回以内	7 回以内			
	褐斑病	2000 倍						
うり類 (漬物用)	うどんこ病 つる枯病 炭疽病	2000～4000 倍	収穫 3 日 前まで	5 回以内	5 回以内			
ズッキーニ	うどんこ病	2000 倍	収穫前日 まで	7 回以内	7 回以内			
なす	すすかび病 灰色かび病 うどんこ病	3000 倍		3 回以内	3 回以内			
アスパラガス	茎枯病、斑点病 褐斑病	1000 倍	100～500 L/10a	収穫 7 日 前まで	5 回以内		5 回以内	
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病		100～300 L/10a	収穫前日 まで				
ねぎ	葉枯病 さび病 黒斑病	2000 倍		収穫 30 日 前まで	3 回以内		3 回以内	
にんにく	葉枯病	1000～1500 倍		収穫 3 日 前まで				
にんじん	菌核病	1000 倍		収穫 14 日 前まで	5 回以内		種子 粉衣	5 回以内 (種子粉衣 は 1 回以内、 無人航空機 散布は 2 回 以内)
		500～1000 倍						
		黒葉枯病	—	乾燥種子 重量の 0.5%	は種前	1 回		
トマト	葉かび病	3000～6000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内	
ミニトマト	灰色かび病	6000 倍			2 回以内		2 回以内	
キャベツ	菌核病	1000 倍		収穫 14 日 前まで	3 回以内		3 回以内	
レタス	灰色かび病 菌核病	1000～2000 倍						

2024 年 12 月 25 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミクダジンを 含む 農薬の総 使用回数
いちご	炭疽病 うどんこ病	1000 倍	100～300 L/10a	育苗期 (定植前)	5 回以内	散布	10 回以内 (育苗期は 5 回以内、 本圃では 5 回以内)
	うどんこ病	4000 倍		収穫前日 まで (生育期)			
豆類 (種実、ただし、 だいずを除く)	うどんこ病 炭疽病 褐斑病	1000 倍		収穫 7 日 前まで	3 回以内		3 回以内
ばれいしょ	夏疫病	500 倍			5 回以内		5 回以内
やまのいも	葉渋病	1000～2000 倍					5 回以内 (種いも への処理は 1 回以内、 無人航空機 散布は 3 回以内)
	青かび病	—	種いも 重量の 1%	植付前	1 回	種いも も粉衣	
茶	炭疽病、輪斑病 新梢枯死症 (輪斑病菌による)	1000 倍	200～400 L/10a	摘採 7 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内
たばこ	赤星病 うどんこ病 灰色かび病	1000～2000 倍	100～180 L/10a	収穫 10 日 前まで			
樹木類	炭疽病	1000倍	200～700 L/10a	発病初期	3回以内		3回以内