

登録番号 第 19541 号

オリゼメート®1キログラム剤

特長： ●10a 当たり 1kg 散布で、いもち病、もみ枯細菌病、白葉枯病に優れた効果を発揮します。

オリゼメートは三井化学クロップ&ライフソリューション㈱の登録商標です。

有効成分	プロベナゾール（化管法第1種）・・・24.0%	包装	1kg×12
性状	類白色細粒	有効年限	5年
毒性	普通物*	危険物	-

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

【適用病害虫及び使用方法】

2023年4月1日付内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロベナゾールを含む 農薬の総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 白葉枯病	1～1.3kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内 (移植時までの処理は1回以内)

使用上の注意事項

- 使用量に合わせて秤量し、使い切ること。
- 本剤は湛水状態（湛水深3～5cm）でまきむらのないよう均一に散布し、散布後少なくとも4～5日間はそのまま湛水状態を保ち、田面を露出させたり水を切らしたりしないように注意し、また散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。
- 砂質土など漏水の多い水田での使用はさけること。
- 養魚田での使用はさけること。
- 本剤は予防的に散布した場合に有効である。葉いもち防除の使用適期は、初発の7～10日前であるので、発生予察情報に注意して時期を失しないように散布すること。穂いもち防除の使用適期は、出穂の3～4週間前である。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけること。
- 夏期高温時の使用をさけること。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。
- 散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意すること。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用方法ではその該当がない。

貯蔵上の注意事項-----

直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。