

スタークル®

顆粒水溶剤

スタークルは三井化学クロップ&ライフソリューション(株)の登録商標です。



農林水産省「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に掲載された農薬です。



作物名の
統合

- 「うり類(漬物用、ただし、とうがんを除く)」「とうがん」は「うり類(漬物用)」に包含されました。
- 「なばな類」は「非結球あぶらな科葉菜類」に包含されました。

(2020年11月11日、2021年12月22日の拡大登録内容より抜粋)

果樹・野菜・水稲・茶・花きの多様な場面で活躍します!

■適用害虫及び使用方法(水稲・果樹・茶・さとうきび・てんさいだいず・あすき・えだまめ・花き・樹木類・いぐさ・水田作物・畑作物(休耕田)・いね科牧草)

(2021年12月22日の拡大登録内容を含む)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	カメムシ類	2000	60~150ℓ/10a	7日前			4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3000					
りんご	アブラムシ類 キンモンボソガ シンクイムシ類 キンモンハモグリガ コナカイガラムシ類 カメムシ類	2000	200~700ℓ/10a	前日	3回以内	散布	3回以内
もも ネクタリン	モモチョッキリゾウムシ アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類						
おうとう	オウトウショウジョウバエ カメムシ類						
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 カメムシ類 ケムシ類 コナカイガラムシ類 チュウコクナシキジラミ						
かき	カメムシ類 コナカイガラムシ類 カキノヘタムシガ アザミウマ類	2000	200~700ℓ/10a	前日	3回以内	散布	4回以内 (塗布は1回以内、 散布は3回以内)
マンゴー	チャノキアザミウマ						
小粒核果類	アブラムシ類 カメムシ類 シンクイムシ類	3000	200~700ℓ/10a	前日	3回以内	散布	3回以内 (塗布は1回以内)
ぶどう	カメムシ類 ブドウラカミキリ フタテンヒメヨコバイ						
かんきつ	チャノキアザミウマ コナカイガラムシ類	1000~2000	2000	前日	3回以内	散布	3回以内
	ゴマダラカミキリ	1000					
	アブラムシ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 コアオハナムグリ ケシキスイ類 ミカンバエ アカマルカイガラムシ ヤノネカイガラムシ サンホーゼカイガラムシ ミカンキジラミ コナジラミ類 チャノミドリヒメヨコバイ アオバハゴロモ	2000					
	アブラムシ類 カメムシ類 シンクイムシ類	2000					
あけび(果実)	カメムシ類	1000~2000	100mℓ/株	育苗期	5回以内	株元 灌注	5回以内
キウイフルーツ	カメムシ類	1000~2000		前日	2回以内		2回以内
びわ	カメムシ類 ビワキジラミ	2000		14日	2回以内		2回以内
オリーブ	カメムシ類	2000		14日	2回以内		2回以内
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ	50	100mℓ/株	育苗期	5回以内	株元 灌注	5回以内

*収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
茶	チャノソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキアザミウマ ツマグロアオカスミカメ コミカンアブラムシ	2000	200~400ℓ/10a	摘採7日	2回以内		2回以内
さとうきび	アブラムシ類 カンジャコバネナガカメムシ サトウキビアザミウマ	2000	100~300ℓ/10a	7日	3回以内	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)
てんさい	アブラムシ類 アブラムシ類 アブラムシ類 アブラムシ類 アブラムシ類						
だいず	アブラムシ類 アブラムシ類 アブラムシ類 アブラムシ類	2000	100~300ℓ/10a	7日	3回以内	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
あすき	アブラムシ類	2000	100~300ℓ/10a	7日	3回以内	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
えだまめ	アブラムシ類 アブラムシ類 アブラムシ類 アブラムシ類	2000	100~300ℓ/10a	7日	2回以内	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
花き類・観葉植物(きくを除く)	アブラムシ類 アブラムシ類 アブラムシ類 アブラムシ類	2000~3000	1ℓ/m ²	発生初期	5回以内	株元 灌注	5回以内 (土壌混和は1回以内)
きく	アブラムシ類 アブラムシ類 アブラムシ類 アブラムシ類	2000~3000	100~300ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内 (土壌混和は1回以内)
樹木類(つじ類、つばき類を除く)	ケムシ類	2000	100~700ℓ/10a	発生初期	2回以内	株元 灌注	5回以内 (株元灌注は2回以内)
つばき類	チャドクガ	100	0.5~2ℓ/樹(但し、220ℓ/10aまで)	発生初期	2回以内	株元 灌注	5回以内 (株元灌注は2回以内)
つじ類	ツツジゲンバイ ケムシ類	2000	100~300ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
いぐさ	イグサシンムシガ	1000	100~150ℓ/10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内
水田作物、畑作物(休耕田)*	カメムシ類	2000	60~150ℓ/10a	-	3回以内	散布	3回以内
いね科牧草	アブラムシ類	2000	100~300ℓ/10a	7日	3回以内	散布	3回以内

★ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期*	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
かき	コナカイガラムシ類	20~40g/樹	発芽前~発芽期	1回	本剤1g当たり水1mℓの割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いだ部分に塗布する。	4回以内 (塗布は1回以内、 散布は3回以内)
ぶどう	クビアカスシバ	40g/樹	幼果期まで但し、収穫30日前まで	1回	本剤1g当たり水1mℓの割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いだ部分に塗布する。	3回以内 (塗布は1回以内)

本製品は農業用殺虫剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。本印刷物は2021年12月22日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成しています。

STW1 W02Y

