サブリナフロアブル（第 21694 号）

2024 年 12 月 11 日現在

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用病害虫名</th><th>希釈倍数</th><th>使用液量</th><th>使用時期</th><th>本剤の使用回数</th><th>使用方法</th><th>BT を含む農薬の総使用回数</th></tr>
<tr><td rowspan="5">野菜類
(はくさいを除く)</td><td>ｺﾅｶﾞ</td><td>1000～1500 倍</td><td rowspan="3">100～300
L/10a</td><td rowspan="9">発生初期
収穫前日
まで</td><td rowspan="12">－</td><td rowspan="12">散布</td><td rowspan="12">－</td></tr>
<tr><td>ｱｵﾑｼ
ﾖﾄｳﾑｼ
ﾄﾏﾄｷﾊﾞｶﾞ （ﾄﾏﾄ、ﾐﾆﾄﾏﾄ）
ﾍﾞﾆﾌｷﾉﾒｲｶﾞ(えごま(葉))</td><td>1000 倍</td></tr>
<tr><td>ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ</td><td>500～750 倍</td></tr>
<tr><td>ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ(ねぎ)</td><td>500 倍</td></tr>
<tr><td>ﾏｲﾏｲｶﾞ(食用ほおのき(葉))
ｹﾑｼ類（食用さくら(葉)、食用さくら(花)</td><td>1000 倍</td><td>200～700
L/10a</td></tr>
<tr><td rowspan="2">はくさい</td><td>ｺﾅｶﾞ</td><td>1000～1500 倍</td><td rowspan="6">100～300
L/10a</td></tr>
<tr><td>ｱｵﾑｼ
ﾖﾄｳﾑｼ</td><td rowspan="3">1000 倍</td></tr>
<tr><td>えごま
(種子)</td><td>ﾍﾞﾆﾌｷﾉﾒｲｶﾞ</td></tr>
<tr><td>からしな
(種子)</td><td>ｱｵﾑｼ
ｺﾅｶﾞ
ﾖﾄｳﾑｼ</td></tr>
<tr><td></td><td>ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ</td><td>500～750 倍</td></tr>
<tr><td>雑穀類</td><td>ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ
ｲﾈﾖﾄｳ(ひえ)</td><td rowspan="4">1000 倍</td></tr>
<tr><td>飼料用
とうも
ろこし</td><td>ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ</td></tr>
<tr><td>茶</td><td>ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ
ﾁｬﾊﾏｷ
ﾁｬﾉﾎｿｶﾞ</td><td>200～400
L/10a</td><td>発生初期
摘採 7 日
前まで</td></tr>
<tr><td>樹木類</td><td>ｹﾑｼ類</td><td>200～700
L/10a</td><td>発生初期</td></tr>
</table>