

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオフラトを含む農薬の総使用回数	
小麦	赤さび病	2000 倍	60~150 L /10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	
未成熟とうもろこし	紋枯病			収穫 7 日前まで	2 回以内		2 回以内	
キャベツ	株腐病 根朽病 灰色かび病	2000 倍	100~300 L /10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内	
	菌核病							
はくさい	黒斑病 白斑病 尻腐病							
はなやさい類	黒すす病 根朽病 菌核病							
きゅうり	灰色かび病							
	菌核病							
すいか	うどんこ病							
	つる枯病							
メロン	うどんこ病							2000~4000 倍
トマト	灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病							2000 倍
	うどんこ病	2000~4000 倍						
ミニトマト	灰色かび病 菌核病 斑点病 葉かび病 すすかび病	2000 倍						
	灰色かび病 黒枯病 斑点病	2000~4000 倍						
ピーマン	うどんこ病	2000~4000 倍						
	白絹病		1L/株			株元灌注		
なす	菌核病 すすかび病 褐色斑点病 褐色円星病	2000 倍	100~300 L /10a			散布		
ししとう	灰色かび病 うどんこ病							
	黒枯病 斑点病							
かぼちゃ	つる枯病							
にがうり ズッキーニ	うどんこ病							
オクラ	灰色かび病 うどんこ病							
いちご	輪斑病							
	白星病							

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチピラトを含む農薬の総使用回数	
らっかせい	白絹病 褐斑病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内	
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)	灰色かび病 菌核病 さび病							
豆類 (未成熟、ただし、えだまめを除く)								
だいず えだまめ	うどんこ病							
レタス 非結球レタス	灰色かび病 菌核病 すそ枯病 白絹病	1000～ 2000 倍	0.5～1L/ m ²	収穫前日 まで	2 回以内	株元灌注	2 回以内	
にら	白斑葉枯病 さび病 黒腐菌核病					白絹病	散布	3 回以内
にら(花茎)	白斑葉枯病 さび病 白絹病					散布		
エンダイブ	すそ枯病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内	
ねぎ	白絹病 黒腐菌核病	1000～ 2000 倍	1L/m ²	生育期 但し、 収穫 14 日前まで	2 回以内	株元 灌注	4 回以内 (株元灌注は 2 回以内、 散布及び無人 航空機散布は 合計 2 回 以内)	
	白絹病 さび病 黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病	2000 倍	100～300 L /10a	収穫前日 まで		4 回以内		散布
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病				散布		4 回以内	
アスパラガス	茎枯病 褐斑病 斑点病 さび病 葉枯病				3 回以内		散布	4 回以内 (種球塗沫は 1 回以内、散布は 3 回以内)
にんにく	黒腐菌核病	原液	種球重量の 0.5～1.0%	植付前	1 回	種球塗沫	1 回以内、散布は 3 回以内)	
セルリー	斑点病 菌核病	2000 倍	100～300 L /10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内	
にんじん	黒葉枯病 白絹病			収穫 7 日 前まで				
パセリ	うどんこ病			2 回以内	2 回以内			
しそ	灰色かび病 斑点病							
しそ(花穂)				3 回以内	3 回以内			
つるな	菌核病							
小粒核果類 もも ネクタリン	黒星病 灰星病	200～700 L /10a	200～700 L /10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内	
おうとう	灰星病 幼果菌核病			3 回以内	3 回以内			
なし	黒星病 赤星病 うどんこ病							

2023年2月22日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペクチンオリゴ糖を含む農薬の総使用回数
ぶどう	灰色かび病 晩腐病 黒とう病 褐斑病 うどんこ病 さび病	2000 倍	200～700 L /10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内
りんご	黒星病 赤星病 うどんこ病 斑点落葉病 褐斑病 モニリア病 黒点病 すす点病 すす斑病			収穫前日 まで			
かんきつ	灰色かび病 そうか病						
かき	落葉病						
てんさい	根腐病	200～400 倍	ペーパーポット 1 冊当り1L (3L/m ²)	移植前	1 回	苗床灌注	4 回以内 (苗床灌注は 1 回以内、 散布は 3 回 以内)
	葉腐病		100～300 L /10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内		3 回以内
食用さくら (葉)	うどんこ病 せん孔褐斑病	200～700 L /10a					
食用ぎく	白さび病 灰色かび病 うどんこ病	2000 倍	100～300 L /10a	発病初期	2 回以内	散布	3 回以内
きく	葉枯病 灰色かび病 うどんこ病						
ゆり	褐色斑点病 灰色かび病 うどんこ病						
チューリップ ^o	灰色かび病 うどんこ病 花腐菌核病 褐斑病 黒斑病						
花き類・ 観葉植物 (きく、ゆり、 チューリップ、りん どうを除く)	灰色かび病 うどんこ病						
とうき	苗立枯病	500～ 1000 倍	セル成型育苗 トレイ1箱 または ペーパーポット 1 冊 (30×60cm・ 使用土壌 約 1.5～4.0L) 当り 0.2L	育苗期	5 回以内	灌注	5 回以内
とりかぶと (薬用)	白絹病	1000 倍	1L/m ²	生育期	3 回以内	株元灌注	3 回以内
たばこ	菌核病	2000 倍	100～ 180L/10a	収穫 10 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内

2023 年 2 月 22 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオピラドを含む農薬の総使用回数
きゅうり	温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所	うどんこ病	150g/10a	10 L /10a	収穫前日まで	3 回以内	常温煙霧	3 回以内
なす		すすかび病						