

2025 年 1 月 29 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオフラドを含む農薬の総使用回数		
小麦	赤さび病	2000 倍	60～150 L /10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内		
未成熟とうもろこし	紋枯病		100～300 L /10a	収穫 7 日前まで	2 回以内		2 回以内		
キャベツ	株腐病 根朽病 灰色かび病			3 回以内	収穫前日まで		3 回以内	3 回以内	
	菌核病								
はくさい	黒斑病 白斑病 尻腐病								
はなやさい類	黒すす病 根朽病 菌核病								
	きゅうり								灰色かび病
	すいか								菌核病 うどんこ病
つる枯病									
メロン	うどんこ病								2000～4000 倍
トマト	灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病	2000 倍							
	ミニトマト	うどんこ病	2000～4000 倍						
ピーマン		灰色かび病 菌核病 斑点病 葉かび病 すすかび病	2000 倍						
	うどんこ病	2000～4000 倍							
	白絹病	2000 倍	1L/株	散布					
なす	菌核病 すすかび病 褐色斑点病 褐色円星病		100～300 L /10a		散布				
	灰色かび病 うどんこ病								
ししとう	黒枯病 斑点病								
	かぼちゃ					つる枯病			
にがうり ズッキーニ	うどんこ病								
オクラ	灰色かび病 うどんこ病								
いちご	輪斑病 黒色根腐病								
	しょうが					白星病			

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチレートを含む農薬の総使用回数
らっかせい	白絹病 褐斑病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
豆類 (種実、ただし、 らっかせい、 いんげんまめ を除く)	灰色かび病 菌核病 さび病						
豆類 (未成熟、た だし、えだま め、さやいん げんを除く)							
だいず えだまめ							
いんげんまめ さやいんげん	灰色かび病 菌核病 さび病 角斑病						
レタス 非結球レタス	灰色かび病 菌核病 すそ枯病 白絹病	1000～ 2000 倍	0.5～1L/ m ²	2 回以内	株元灌注	2 回以内	
にら	白斑葉枯病 褐色葉枯病 さび病						
	白絹病 黒腐菌核病						
にら(花茎)	白斑葉枯病 さび病 白絹病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで 生育期 但し、 収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
エンダイブ	すそ枯病						
ねぎ	白絹病 黒腐菌核病	1000～ 2000 倍	1L/m ²	収穫前日 まで	2 回以内	株元 灌注	4 回以内 (株元灌注は 2 回以内、 散布及び無人 航空機散布は 合計 2 回 以内)
	白絹病 さび病 黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病						
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 黒腐菌核病	2000 倍	100～300 L /10a		4 回以内	散布	4 回以内
アスパラガス	茎枯病 褐斑病 斑点病						
にんにく	さび病 葉枯病						
	黒腐菌核病						
セルリー	斑点病 菌核病	2000 倍	100～300 L /10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
しゅんぎく	葉枯病			収穫 7 日 前まで			

2025 年 1 月 29 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオピラトを含む農薬の総使用回数	
にんじん	黒葉枯病 白絹病 うどんこ病 菌核病 斑点病	2000 倍	100～300 L /10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	
パセリ	うどんこ病			収穫 3 日前まで	2 回以内		2 回以内	
しそ	灰色かび病 斑点病			収穫前日まで				
しそ(花穂)			3 回以内		3 回以内			
つるな	菌核病							
どくだみ	白絹病		1～3L/㎡	生育期 但し、 収穫 14 日前まで	2 回以内	灌注	2 回以内	
小粒核果類 もも ネクタリン	黒星病 灰星病	2000 倍	200～700 L /10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内	
おうとう	灰星病 幼果菌核病							
なし	黒星病 赤星病 うどんこ病							
ぶどう	灰色かび病 晩腐病 黒とう病 褐斑病 うどんこ病 さび病			収穫 7 日前まで				
りんご	黒星病 赤星病 うどんこ病 斑点落葉病 褐斑病 モニリア病 黒点病 すす点病 すす斑病			収穫前日まで				
かんきつ	灰色かび病 そうか病							
かき	落葉病							
てんさい	根腐病	200～400 倍	ペーパーポット 1 冊当り1L (3L/㎡)	移植前	1 回	苗床灌注	4 回以内 (苗床灌注は 1 回以内、 散布は 3 回 以内)	
	葉腐病	2000 倍	100～300 L /10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布		3 回以内
食用さくら (葉)	うどんこ病 せん孔褐斑病		200～700 L /10a				2 回以内	
食用ぎく	白さび病 灰色かび病 うどんこ病		100～300 L /10a	発病初期	3 回以内			
きく	黒さび病							
	ゆり						葉枯病 灰色かび病 うどんこ病	

2025 年 1 月 29 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオピラドを含む農薬の総使用回数
チューリップ	褐色斑点病 灰色かび病 うどんこ病	2000 倍	100～300 L /10a	発病初期	3 回以内	散布	3 回以内
りんどう	灰色かび病 うどんこ病 花腐菌核病 褐斑病 黒斑病						
花き類・ 観葉植物 (きく、ゆり、 チューリップ、りん どうを除く)	灰色かび病 うどんこ病						
あじさい	うどんこ病		200～400 L /10a	発病前～ 発病初期			
とうき	苗立枯病	500～ 1000 倍	セル成型育苗 トレイ1箱 または ペーパーポット 1冊 (30×60cm・ 使用土壌 約 1.5～4.0L) 当り 0.2L	育苗期	5 回以内	灌注	5 回以内
とりかぶと (薬用)	白絹病	1000 倍	1L/㎡	生育期	3 回以内	株元灌注	3 回以内
たばこ	菌核病	2000 倍	100～ 180L/10a	収穫 10 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオピラトを含む農薬の総使用回数
きゅうり	温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所	うどんこ病	150g/10a	10 L /10a	収穫前日まで	3 回以内	常温 煙霧	3 回以内
なす		すすかび病						