

M I Cアディオン乳剤 (第22431号) (1/5)

2025 年 3 月 12 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペルメトリン を含む 農薬の総 使用回数
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類	2000～3000倍	200～ 700 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	ハマキムシ類 カメムシ類	2000倍					
もも	カメムシ類			2000～3000倍	収穫7日前まで		6回以内
	シンクイムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類						
	モモハモクグリガ	2000～4000倍					
かき	カキノハタムシガ カメムシ類 チャノキイロアザミウマ カキタマアザミウマ	2000～3000倍		5回以内	5回以内		5回以内
	カキタマアザミウマ	2000倍					
	キウイフルーツ	キイロマイコガ カメムシ類					
くり	クリタマハチ	1000～2000倍		羽化脱出期 但し収穫14日 前まで	6回以内		6回以内
	クリシギゾウムシ	2000倍					
かんきつ	ミカンハモクグリガ アブラムシ類 チャノキイロアザミウマ カメムシ類	2000～4000倍 2000～3000倍 2000倍		収穫14日前まで	6回以内		6回以内
	アザミウマ類 アブラムシ類 イチジクヒトリモドキ	3000倍					
	アロニア	シンクイムシ類					
さるなし	キイロマイコガ カメムシ類	2000～3000倍					
ネクタリン	シンクイムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類 モモハモクグリガ		2000～4000倍				
きゅうり	オンシツコナジラミ アブラムシ類 ウリハムシ		2000～3000倍	100～ 300L/ 10a	収穫前日まで	3回以内	6回以内 (乳剤は3回 以内、粒剤は 3回以内)
ズッキーニ	アブラムシ類 フキノメイガ	収穫7日前まで					
にがうり	アブラムシ類 カメムシ類 タバコカスミカメ ヨトウムシ類 フキノメイガ	収穫前日まで		5回以内	3回以内		
すいか メロン かぼちゃ いちご	アブラムシ類					5回以内	5回以内
ごぼう	ヨトウムシ	2000倍		収穫7日前まで	2回以内		
しゅんぎく	アブラムシ類 ハクサイタニ	4000倍					

MICアディオン乳剤（第22431号）（2/5）

2025年3月12日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペルメトリン を含む 農薬の総 使用回数	
だいず	アブラムシ類 カメシ類 ウコンノメイガ ツメクサガ フタスジヒメハムシ マメシクイガ マメハシヨウ	3000倍	100～ 300L/ 10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
		24倍	0.8 L/10a			無人航空機 による散布		
うめ	アブラムシ類	3000倍	200～ 700 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
ピーマン			2000～3000倍		100～ 300 L/10a		5回以内	5回以内
とうがらし類	タバコガ カメシ類	2000倍		収穫7日前まで			2回以内	2回以内
	アブラムシ類	2000～3000倍			収穫3日前まで		5回以内	5回以内 (株元灌注は2 回以内)
キャベツ	アブラムシ類 アオムシ コナガ タマキギンウリハ ヨトウムシ	2000倍					5回以内	
	ネリムシ類	4000～8000倍	0.5 L/m ²	収穫21日前まで	2回以内	株元灌注		
	アオムシ ヨトウムシ	32倍	1.6～ 3.2 L/10a	収穫3日前まで	5回以内	無人航空機 による散布		
はくさい	アブラムシ類 アオムシ コナガ ハクサイダニ ヨトウムシ	2000倍	100～ 300 L/10a	収穫7日前まで		5回以内	散布	5回以内
	ネリムシ類	4000～8000倍	0.5～ 1 L/m ²				株元灌注	
	アオムシ ヨトウムシ	32倍	1.6～ 3.2 L/10a		無人航空機 による散布			
		64倍	3.2 L/10a					
だいこん	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ ダイコンハムシ	2000倍	100～ 300 L/10a	収穫30日前まで	4回以内	散布	4回以内	
	アブラムシ類	2000～3000倍						
かぶ	アオムシ	2000倍		収穫前日まで	2回以内		4回以内 (散布は 2回以内)	
茎ブロッコリー					3回以内		3回以内	
ブロッコリー	ネリムシ類	4000～8000倍	0.5～ 1 L/m ²	収穫7日前まで	5回以内	株元灌注	5回以内	
	アブラムシ類	2000～3000倍	100～ 300 L/10a	収穫3日前まで		散布		
	コナガ	2000倍						
カリフラワー	アブラムシ類	2000～3000倍						

MICアデオン乳剤（第22431号）（3/5）

2025年3月12日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペルメトリン を含む 農薬の総 使用回数
レタス	アブラムシ類 ヨトウムシ	2000～3000倍	100～ 300 L/10a	収穫3日前まで	5回以内	散布	5回以内
非結球レタス				収穫前日まで	2回以内		4回以内 (乳剤は2回 以内、粒剤は 2回以内)
トレビス	アブラムシ類	3000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
たまねぎ	アザミウマ類 ネギコガ ハスモンヨトウ	3000倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内
ねぎ	アザミウマ類 ネギコガ	2000～3000倍	3回以内		3回以内		
	シロイモシヨトウ	2000倍					
	ネリムシ類	4000～8000倍	0.5 L/㎡			株元灌注	
ハスカップ	ハマキムシ類 アブラムシ類	2000～3000倍	200～ 700 L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
にんにく	ネギコガ アブラムシ類		100～ 300 L/10a	収穫前日まで			無人航空機 による散布
	アブラムシ類	32～48倍	1.6L /10a				
アスパラガス	ジユウシホシクビナガハムシ カメムシ類	2000～3000倍	100～ 300 L/10a	収穫21日前まで	1回	散布	3回以内
	ヨトウムシ アブラムシ類	2000倍					1回
はこべ	オオタバコガ	3000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
さやいんげん	カメムシ類						
豆類 (未成熟、ただし、 えだまめ、さやい んげん、さやえん どう、未成熟そら まめを除く)	アザミウマ類 アブラムシ類 ハモグリバエ類 ヨトウムシ類 ウラナミシジミ アズキノメイガ マメシクイガ						
えだまめ	ウコンノメイガ ツメクサガ フタスジヒメハムシ マメハシヨウ						
未成熟そらまめ	アザミウマ類 アブラムシ類 ハモグリバエ類 ヨトウムシ類 ウラナミシジミ アズキノメイガ マメシクイガ						
さやえんどう	ヨトウムシ類 ハモグリバエ ウラナミシジミ						
ほうれんそう	アブラムシ類 ハクサイタニ			収穫14日前まで			

MICアデオン乳剤（第22431号）（4/5）

2025年3月12日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペルメリン を含む 農薬の総 使用回数								
しそ	ハスモンヨトウ ウリハムシモドキ アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	4000倍	100～ 300 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	4回以内 (乳剤は2回以 内、粒剤は2 回以内)								
トマト	オンシツコナジラミ アブラムシ類	2000～3000倍			3回以内		3回以内	3回以内							
ミニトマト								4回以内（株 元散布は1回 以内、散布及 び噴射は合計 3回以内）							
なす									アブラムシ類 オンシツコナジラミ テントウムシダマシ類 カメムシ類	2000～3000倍	2000倍	3回以内	3回以内		
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ テントウムシダマシ類 カメムシ類	2000～3000倍		2000倍	収穫14日前まで		4回以内	4回以内							
ばれいしょ	アブラムシ類 テントウムシダマシ類	2000～3000倍		アワノメイガ アブラムシ類					2000倍 2000～3000倍	2000倍	2000～3000倍				
とうもろこし	アワノメイガ	2000倍										アズキノメイガ アブラムシ類	2000倍 2000～3000倍	2000倍	2000～3000倍
とうもろこし	アブラムシ類	2000～3000倍													
あずき	アズキノメイガ	2000倍	アブラムシ類 ヤマノイモコガ アザミウマ類	2000～3000倍	2000倍	2000～3000倍									
あずき	アブラムシ類	2000～3000倍					ハスモンヨトウ アブラムシ類 スズメガ類	2000倍 2000～3000倍	2000倍	2000～3000倍					
やまのいも	アブラムシ類 ヤマノイモコガ アザミウマ類	2000～3000倍									ハスモンヨトウ アブラムシ類 スズメガ類	2000倍 2000～3000倍	2000倍	2000～3000倍	
さといも	ハスモンヨトウ	2000倍	アブラムシ類 スズメガ類	2000～3000倍	2000倍	2000～3000倍									
さといも	アブラムシ類 スズメガ類	2000～3000倍					アブラムシ類 スズメガ類	2000～3000倍	2000倍	2000～3000倍					
さといも (葉柄)	ハスモンヨトウ	2000倍									アブラムシ類 スズメガ類	2000～3000倍	2000倍	2000～3000倍	
さといも (葉柄)	アブラムシ類	3000倍	アブラムシ類 スズメガ類	2000～3000倍	2000倍	2000～3000倍									
かんしょ	イモコガ	3000倍					アブラムシ類 スズメガ類	2000～3000倍	2000倍	2000～3000倍					
茶	チャノコカクモンハマキ	2000倍									チャノミドリヒメヨコバイ チャノホリガ チャノキイロアザミウマ	2000～3000倍	2000倍	2000～3000倍	
茶	チャノミドリヒメヨコバイ チャノホリガ チャノキイロアザミウマ	2000～3000倍	アブラムシ類	3000倍	2000倍	2000～3000倍									
そらまめ	アブラムシ類	3000倍					アブラムシ類	3000倍	2000倍	2000～3000倍					
オクラ	ハスモンヨトウ アブラムシ類 カメムシ類	2000倍									アオムシ コナガ	2000倍	2000倍	2000～3000倍	
なばな類	アオムシ コナガ		アオムシ	2000倍	2000倍	2000～3000倍									
非結球あぶらな科 葉菜類 (こまつな、非結球 はくさい、みずな、 なばな類を除く)	アオムシ						2000倍	2000倍	2000倍	2000～3000倍					
こまつな	ハクサイタニ	2000倍									2000倍	2000倍	2000～3000倍		
非結球はくさい	アオムシ		2000倍	2000倍	2000倍	2000～3000倍									

MICアデオン乳剤 (第22431号) (5/5)

2025 年 3 月 12 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペルメトリン を含む 農薬の総 使用回数		
みずな	アブラムシ類 ダイコンハムシ ヤサイゾウムシ	2000～3000倍	100～ 300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
	アオムシ	2000倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内		
つるむらさき	ヨトウムシ							2000倍	収穫14日前まで
食用亜麻	ヨトウガ	収穫3日前まで							
ごま	アブラムシ類 カメムシ類			収穫前日まで	5回以内				
食用ゆり	アブラムシ類						3000倍		収穫14日前まで
葉ごぼう									
はまなす (果実)	シンクイムシ類	2000倍	200～ 700 L/10a	収穫7日前まで	2回以内		2回以内		
花き類・ 観葉植物 (はばたんを除く)	アブラムシ類	2000～4000倍	100～ 300 L/10a	発生初期	6回以内		6回以内		
	カメムシ類 ハマキムシ類 ヨトウムシ類	2000倍							
はばたん	アブラムシ類	2000～4000倍						2000倍	
	カメムシ類 ハマキムシ類 ヨトウムシ類 アオムシ	2000倍							
樹木類 (くちなしを除く)	ケムシ類 アブラムシ類 シャクトリムシ類	4000～8000倍	200～ 700 L/10a						
くちなし	アザミウマ類	2000倍							