

果樹・野菜の害虫防除に

アディオ[®]

乳剤

作物いろいろワイドにまもる

ただいま
登録作物 **70種以上!**

適用拡大

害虫追加

「ブロッコリー」、「ねぎ」の
「ネキリムシ類」等

使用方法

「だいず」の「カメムシ類」に
「無人航空機による散布」等

※詳細は裏面でご確認ください。



適用作物・害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法	
なし	アブラムシ類、シンクイムシ類 ハマキムシ類、カメムシ類	2,000～3,000	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	
もも	カメムシ類	2,000		収穫7日前まで	6回以内		
	モモハモグリガ	2,000～4,000					
	シンクイムシ類、アブラムシ類	2,000～3,000					
	ハマキムシ類	2,000～3,000					
かき	カキノヘタムシガ、カメムシ類、チャノキイロアザミウマ	2,000～3,000		2,000	5回以内		
	カキクダアザミウマ	2,000					
キウイフルーツ	キイロマイコガ	2,000～3,000		2,000	羽化脱出期但し 収穫14日前まで		6回以内
	カメムシ類	2,000					
くり	グリタマバチ	1,000～2,000		2,000	収穫14日前まで		2回以内
	グリシギゾウムシ	2,000					
	ミカンハモグリガ、アブラムシ類	2,000～4,000					
かんきつ	チャノキイロアザミウマ	2,000～3,000		2,000	収穫7日前まで		3回以内
	カメムシ類	2,000					
いちじく	アザミウマ類、アブラムシ類	3,000		2,000	収穫7日前まで		3回以内
	イチジクヒトリモドキ		2,000				
アロニア	シンクイムシ類	2,000	2,000	収穫7日前まで	3回以内		
はまなす(果実)	キイロマイコガ					2,000	
さるなし	カメムシ類	2,000	2,000	収穫7日前まで	3回以内		
	シンクイムシ類、アブラムシ類、ハマキムシ類					2,000～3,000	
ネクタリン	モモハモグリガ	2,000～4,000	2,000	収穫7日前まで	3回以内		
	オンシツコナジラミ、アブラムシ類、ウリハムシ	2,000					
きゅうり	ズッキーニ	2,000～3,000	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	*1	無人航空機 による散布	
にがうり	アブラムシ類、フキノメイガ			収穫7日前まで	3回以内		
	カメムシ類、ヨトウムシ類、タバコカスミカメ			5回以内			
すいか	アブラムシ類				3,000		収穫7日前まで
メロン	2,000～3,000	2,000	収穫7日前まで	3回以内			
かぼちゃ	ヨトウムシ				2,000	収穫7日前まで	3回以内
いちご	フタスジヒメハムシ、マメハンミョウ、ツメクサガ	3,000	0.8ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内		
ごぼう	ウコンノメイガ、カメムシ類、マメシンクイガ、アブラムシ類	24				200～700ℓ/10a	収穫前日まで
だいず	マメシンクイガ、アブラムシ類、カメムシ類	2,000～3,000	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内		
うめ	アブラムシ類	2,000				100～300ℓ/10a	収穫7日前まで
ピーマン	タバコガ、カメムシ類	2,000	0.5ℓ/㎡	収穫21日前まで	*2		
とうがらし類	タバコガ	2,000				100～300ℓ/10a	収穫7日前まで
	アブラムシ類	2,000～3,000	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内		
キャベツ	ネキリムシ類	4,000～8,000				0.5ℓ/㎡	収穫7日前まで
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	2,000	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内		
はくさい	ヨトウムシ、タマナギンウワバ	2,000				100～300ℓ/10a	収穫7日前まで
だいこん	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	2,000	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内		
	ハイマダラノメイガ、ダイコンハムシ	2,000～3,000				0.5ℓ/㎡	収穫7日前まで
かぶ	アブラムシ類	2,000	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内		
茎ブロッコリー	アオムシ	2,000				100～300ℓ/10a	収穫7日前まで
ブロッコリー	コナガ	2,000	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内		
	アブラムシ類	2,000				100～300ℓ/10a	収穫7日前まで
カリフラワー	ネキリムシ類	8,000	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内		
	コナガ	2,000				100～300ℓ/10a	収穫7日前まで
レタス	アブラムシ類	2,000	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内		
非結球レタス	アブラムシ類、ヨトウムシ	2,000				100～300ℓ/10a	収穫7日前まで
トレビス	アブラムシ類	3,000	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内		
たまねぎ	ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ネギコガ	2,000				100～300ℓ/10a	収穫7日前まで
ねぎ	アザミウマ類、ネギコガ	2,000	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内		
	シロイチモジヨトウ	2,000				100～300ℓ/10a	収穫7日前まで
にんにく	ネキリムシ類	4,000～8,000	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内		
	ネギコガ、アブラムシ類	2,000～3,000				1.6ℓ/10a	収穫7日前まで
	アブラムシ類	32～48倍	1.6ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内		

2024年6月現在の登録内容(太字は2024年5月29日適用拡大)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法	
ハスカップ	ハマキムシ類、アブラムシ類	2,000～3,000	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	
アスパラガス	ジウシホシクビナガハムシ、カメムシ類 ヨトウムシ、アブラムシ類	2,000	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内		
さやいんげん	カメムシ類	3,000		収穫14日前まで			
未成熟そらまめ	アザミウマ類、アブラムシ類 ハモグリバエ類、ヨトウムシ類 ウラナミシジミ、アズキノメイガ マメシンクイガ			収穫7日前まで			
豆類 〔未成熟、但し、 さやいんげん、 さやえんどう、 未成熟そらまめ、 えだまめを除く〕				収穫14日前まで			
えだまめ				収穫前日まで			
さやえんどう				収穫前日まで			
ほうれんそう				収穫14日前まで			
しゅんぎく	アブラムシ類、ハクサイダニ	2回以内					
しそ	ハスモンヨトウ、アブラムシ類 アザミウマ類、コナジラミ類 ウリハムシモドキ	4,000		収穫前日まで	*4		
オクラ	ハスモンヨトウ、アブラムシ類、カメムシ類	2,000		収穫前日まで	3回以内		
トマト	オンシツコナジラミ、アブラムシ類	2,000～3,000			*5		
ミニトマト	アブラムシ類	2,000			3回以内		
なす	オンシツコナジラミ、カメムシ類 テントウムシダマシ類						
なばな類	コナガ、アオムシ						
ばれいしょ	アブラムシ類、テントウムシダマシ類	2,000～3,000			収穫14日前まで		4回以内
とうもろこし	アワノメイガ	2,000					
あずき	アブラムシ類	2,000					
	アズキノメイガ	2,000					
やまのいも	アブラムシ類	2,000～3,000		収穫7日前まで	3回以内		
	アブラムシ類、アザミウマ類、ヤマノイモコガ	2,000～3,000					
さといも	ハスモンヨトウ	2,000			5回以内		
	アブラムシ類、スズメガ類	2,000～3,000					
さといも(葉柄)	ハスモンヨトウ	2,000			2回以内		
	アブラムシ類	3,000			5回以内		
かんしょ	イモコガ	2,000		200～400ℓ/10a	摘採14日前まで		1回
茶	チャノコカクモンハマキ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ、チャノキイロアザミウマ	2,000～3,000		100～300ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内
そらまめ	アブラムシ類	3,000					
非結球あぶらな科葉菜類 (こまつな、非結球はくさい、 みずな、なばな類を除く)	アオムシ	2,000					
こまつな	ハクサイダニ	2,000～4,000					
非結球はくさい	アオムシ	2,000～3,000					
みずな	アブラムシ類、ダイコンハムシ ヤサイゾウムシ	2,000					
	アオムシ	2,000					
つるむらさき	ヨトウムシ	3,000	収穫7日前まで		2回以内		
食用ゆり	アブラムシ類	2,000	収穫前日まで		5回以内		
食用亜麻	ヨトウガ	3,000	収穫14日前まで		2回以内		
葉ごぼう	アブラムシ類	2,000	収穫3日前まで		3回以内		
ごま	アブラムシ類、カメムシ類	3,000	収穫21日前まで		1回		
はこべ	オオタバコガ	2,000～4,000	発生初期		6回以内		
花き類・観葉植物 (はばたんを除く)	アブラムシ類	2,000					
はばたん	カメムシ類、ハマキムシ類、ヨトウムシ類	2,000					
	アオムシ	2,000～4,000					
アブラムシ類	4,000～8,000	200～700ℓ/10a					
樹木類(くちなしを除く)	ケムシ類、アブラムシ類、シャクトリムシ類						2,000
くちなし	アザミウマ類	2,000					

*印は本剤及びペルメトリンを含む農薬の総使用回数
*1:本剤は3回以内、ペルメトリンを含む農薬の総使用回数は6回以内(乳剤は3回以内、粒剤は3回以内) *2:本剤は5回以内(株元灌注は2回以内)、ペルメトリンを含む農薬の総使用回数は5回以内(株元灌注は2回以内)
*3:本剤は2回以内、ペルメトリンを含む農薬の総使用回数は4回以内(散布は2回以内) *4:本剤は2回以内、ペルメトリンを含む農薬の総使用回数は4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) *5:本剤は3回以内、ペルメトリンを含む農薬の総使用回数は4回以内(株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内)

使用上の注意事項(抜粋)



- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- かんきつ、茶での散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意してください。
- みずかけな(水掛菜)、カラー及び花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- ねぎのシロイチモジヨトウの防除に使用する場合は、食入前の若令幼虫期に散布してください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、無人航空機散布の注意を守ってください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合は吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 原液は眼に対して刺激性があるので、薬液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 原液は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は、農薬用マスク、手袋などを着用してください。また、薬液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ① ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。

● 小児の手の届く所には置かないでください。● 空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。