

2023年2月8日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
みかん	黒点病	400～800倍	200～700 L/10a	収穫 30 日 前まで	4 回以内	散布	4 回以内
	小黒点病	600～800倍					
	そうか病	400 倍					
	チャノキイロアザミウマ そばかす病 褐色腐敗病	400～600倍					
	ミカンサビダニ	1000 倍					
	炭疽病	600 倍					
かんきつ (みかんを 除く)	チャノキイロアザミウマ 炭疽病 褐色腐敗病 そばかす病 汚れ果症	600 倍		収穫 90 日 前まで			
	黒点病 小黒点病	600～800倍					
	ミカンサビダニ	1000 倍					
かき	炭疽病 落葉病	400～800倍		収穫 45 日 前まで	2 回以内		2 回以内
	うどんこ病	400 倍					
なし	黒星病 赤星病	400～600倍		収穫 30 日 前まで	5 回以内		5 回以内
	黒斑病 輪紋病	600 倍					
りんご	黒星病 赤星病 黒点病 斑点落葉病 褐斑病 炭疽病 すす点病 すす斑病	500～600倍			3 回以内		3 回以内
	輪紋病	500 倍					
ぶどう	黒とう病 べと病 晩腐病 褐斑病 さび病	1000 倍	収穫 45 日 前まで		2 回以内	2 回以内	
マンゴー	炭疽病	800 倍					
びわ	たてぼや病	600 倍	落弁期まで				
もも	黒星病 果実赤点病 せん孔細菌病		収穫 21 日 前 まで		3 回以内	3 回以内	
おうとう	灰星病				2 回以内	2 回以内	

M I C ペンコゼブ水和剤（第 2 2 4 3 2 号） 2/3

2023 年 2 月 8 日現在

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数	
トマト	疫病 葉かび病	800 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内	
すいか	炭疽病 つる枯病	400～600 倍		収穫 7 日前まで	7 回以内		7 回以内	
	褐色腐敗病	600 倍			5 回以内		5 回以内	
メロン	つる枯病 べと病	400～600 倍		仮植栽培期 但し 収穫 76 日前まで	6 回以内		6 回以内	
いちご	炭疽病	600 倍		収穫 21 日前まで	2 回以内		2 回以内	
かぼちゃ	べと病 疫病			きゅうり	収穫前日まで		3 回以内	3 回以内
きゅうり	炭疽病 褐斑病 黒星病							
	べと病	600～800 倍		収穫 30 日前まで	3 回以内		3 回以内	
キャベツ	べと病	400～600 倍		収穫 30 日前まで	1 回		1 回	
はくさい	べと病 黒斑病 白斑病	600 倍			収穫 14 日前まで		3 回以内	3 回以内
ねぎ	べと病 黒斑病 さび病			400～600 倍	収穫 3 日前まで		5 回以内	5 回以内
たまねぎ	べと病 黒斑病 灰色かび病	25L/10a			収穫 7 日前まで		10 回以内	10 回以内 (無人航空機散布は 3 回以内)
ばれいしょ	疫病 夏疫病						100 倍	2 回以内
さといも	疫病		500 倍	収穫 21 日前まで		4 回以内	4 回以内	
やまのいも	炭疽病 葉渋病	400～600 倍	25L/10a	収穫 21 日前まで	5 回以内	5 回以内		
てんさい	褐斑病	125 倍		収穫 45 日前まで	3 回以内	3 回以内		
だいず	べと病 紫斑病	400 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前まで	5 回以内	5 回以内		
にんにく	葉枯病	400～600 倍						

M I C ペンコゼブ水和剤（第 2 2 4 3 2 号） 3/3

2023 年 2 月 8 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
さんしょう (果実)	さび病	600 倍	200～700 L/10a	最終収穫後から落葉期まで	3 回以内	散布	3 回以内
オリーブ	炭疽病			収穫90日前まで	2 回以内		2 回以内
アスパラガス (露地栽培)	褐斑病	500 倍	100～300 L/10a	収穫終了後 但し、秋期 まで	6 回以内		6 回以内
	斑点病 茎枯病						
樹木類	炭疽病 斑点症 (シュート・サウコス®菌)	600 倍	200～ 700L/10a	発病初期	4 回以内		4 回以内
	枝枯細菌病			新梢伸長期～発病初期			