

MI CクサトリエースLジャンボ (第22491号)

2009年10月21日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植 水 稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ (北陸)	移植後3日 ～ルビエ2葉 期 ただし、 移植後30日 まで	砂壤土～ 埴土	小包装 (パック) 10個 (300g) /10a	1回	水田に小 包装(パ ック)の まま投げ 入れる	北陸、 関東・東山・東海、 近畿・中国・四国の 普通期及び早期栽 培地帯、九州の早期 栽培地帯
	クログワイ (北陸を除く) オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ (九州) アオミドロ・藻類 による表層はく離 (近畿・中国・四国)	移植後3日 ～ルビエ2.5葉 期 ただし、 移植後30日 まで					九州の普通期栽培 地帯

カエストロールを含む 農薬の総使用回数	ダイムンを含む 農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む 農薬の総使用回数
1回	3回以内 (育苗箱散布は1回以内、 本田では2回以内)	2回以内