

2024 年 8 月 28 日現在

作物名	適用病虫害名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	レピメクチンを含 む農薬の 総使用回数
みかん	ミカンハモグリガ	1000～ 2000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	4 回 以内		4 回以内
	チャノキイロアザミウマ アゲハ類	1000～ 4000 倍					
	ミカンサビダニ	2000～ 4000 倍					
	チャノホリダニ	4000 倍					
かんきつ (みかんを除く)	ミカンハモグリガ	1000～ 2000 倍		収穫 3 日 前まで			
	チャノキイロアザミウマ アゲハ類	1000～ 4000 倍					
	ミカンサビダニ	2000～ 4000 倍					
	チャノホリダニ	4000 倍					
未成熟 とうもろこし	オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	1000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
	ハスモンヨトウ カンザワハダニ	2000 倍					
ヤングコーン	オオタバコガ	1000 倍					
だいず えだまめ	ハスモンヨトウ	2000～ 3000 倍					
豆類(未成熟、た だし、えだまめ、 さやえんどうを 除く)		2000 倍					
さやえんどう		ハモグリバエ類					
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	2000～ 3000 倍					
さといも	ハスモンヨトウ	2000 倍					
いちご	オオタバコガ	1000～ 2000 倍					
	オオタバコガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 トマトサビダニ	2000 倍					
トマト ミニトマト	コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ	1000～ 2000 倍					
	トマトキバガ	1000 倍					

アニキ乳剤 (第22696号) (2/4)

2024年8月28日現在

[illegible]

2024 年 8 月 28 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	レピメクチンを含 む農薬の 総使用回数
カリフラワー	コナガ ハスモンヨトウ	1000～ 2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
非結球あぶらな 科葉菜類	コナガ ハスモンヨトウ キジノミハシ ハモグリバエ類	1000～ 2000 倍		収穫前日 まで			
レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ シイモジヨウ			収穫 3 日 前まで			
非結球レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ			収穫前日 まで			
アスパラガス	コナジラミ類						
たまねぎ	ハスモンヨトウ						
	シイモジヨウ	2000 倍					
ねぎ	シイモジヨウ ネギコガ	1000 ～ 2000 倍		収穫 3 日前 まで			
	ネギアザミウマ ハモグリバエ類	1000 倍					
だいこん	コナガ アオムシ ハマダラメハシ カブラハバチ類	1000～ 2000 倍		収穫前日 まで			
かぶ	コナガ	1000 倍					
	キジノミハシ	2000 倍					
しそ(花穂)	ハスモンヨトウ						
しそ科葉菜類 (しそを除く)							
しそ							
茶	チャノカクモンハマキ	1000～ 2000 倍	200～400 L/10a		摘採 7 日 前まで	2 回 以内	2 回以内

2024 年 8 月 28 日現在

作物名	適用病虫害名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	レピメクチンを含 む農薬の 総使用回数
食用金魚草 食用なでしこ 食用プリムラ 食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんいちこう 食用トレニア 食用パンジー	ハスモンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
食用ぎく	オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000 倍		収穫 3 日前 まで			
きく(葉)							
きく	マメハモグリバエ	1000 倍		発生初期	6 回 以内		6 回以内
	オオタバコガ ハスモンヨトウ	1000～ 2000 倍					
カーネーション	オオタバコガ						
ストック	コナガ						
りんどう	リンドウホリハマキ	2000 倍					