

2024年8月28日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	インドキサルブを 含む農薬の 総使用回数	
キャベツ	ヨトウムシ ハスモンヨトウ ウリバ類 ハイマダラノメカ シロイチモンジヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日 前まで	2 回 以内	散布	2 回以内	
		10 倍	1～2L /10a			無人航空機 による散布		
		コナガ アオムシ	1000～ 2000 倍			100～300 L/10a		散布
はくさい	ヨトウムシ ハイマダラノメカ カブラハバチ類 シロイチモンジヨトウ ウリバ類	10 倍	1～2L /10a			無人航空機 による散布		
		2000 倍	100～300 L/10a			散布		
	だいこん	ヨトウムシ ハイマダラノメカ カブラハバチ類 コナガ アオムシ ハスモンヨトウ	20 倍			1～2L /10a		無人航空機 による散布
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ シロイチモンジヨトウ ウリバ類	2000 倍	100～300 L/10a	収穫 14 日前まで		散布		
	ねぎ	シロイチモンジヨトウ	20 倍			1～2L /10a		無人航空機 による散布
			10 倍	100～300 L/10a		散布		
		1000 倍						
いちご	ハスモンヨトウ オオタバコカ	2000 倍	100～300 L/10a					収穫前日 まで
トマト	トマトキバカ							
	ハスモンヨトウ オオタバコカ							
なす	テントウムシダマシ類							
	ピーマン			オオタバコカ				
レタス 非結球レタス	ハスモンヨトウ オオタバコカ ヨトウムシ ウリバ類 シロイチモンジヨトウ			20 倍				
えだまめ	ハスモンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	散布				
だいず	ハスモンヨトウ	8～16 倍	800 mL/10a	無人航空機 による散布				

2024年8月28日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	イントキサルブを 含む農薬の 総使用回数
かんしょ	ハスモンヨトウ ナシロシタハ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日 前まで	2 回 以内	散布	2 回以内
		20 倍	1～2L /10a			無人航空機 による散布	
さといも	ハスモンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a			散布	
		20 倍	1～2L /10a			無人航空機 による散布	
しょうが	ハスモンヨトウ アワノメイガ	2000 倍	100～300 L/10a	3 回 以内	散布	3 回以内	
		20 倍	1～2L /10a		無人航空機 による散布		
きく	ハスモンヨトウ オオタバコガ シロイチモシヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	発生初期	4 回 以内	散布	4 回以内
たばこ	タバコアオムシ ヨトウムシ		100～180 L/10a	収穫 10 日前まで	1 回		1 回
樹木類 (さくらを 除く)	ケムシ類	4000 倍	200～700 L/10a	発生初期	4 回 以内		4 回以内
さくら	クビアカツヤカミキリ	1000 倍	200～500 L/10a	成虫発生 初期			