

タチガレエースM液剤 (第22774号)

2023年2月22日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 使用目的 | 希釈 倍数 | 使用 液量 | 使用 時期 | 本剤の 使用 回数 | 使用 方法 | ヒドキシイサ ゾールを含む 農薬の総使 用回数 | マテキル及び マテキルMを 含む農薬の 総使用回数 |
|-------------|--|---------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|---|---|
| 稲 (箱育苗) | 苗立枯病 (フザリウム菌) 苗立枯病 (ヒシウム菌) ムレ苗防止 根の生育促進 移植時の活着促進 | 500～ 1000倍 | 育苗箱 (30×60× 3cm、使用土 壤約5L) 1箱当り 500mL | は種時 又は 発芽後 | 1回 | 土壌 灌注 | 3回以内 (移植前の 土壌混和は 1回以内、 移植前の土 壌灌注及び 灌注は合計 2回以内) | 4回以内 (移植前の 土壌混和は 1回以内、 育苗箱への 灌注は 1回以内、 本田では 2回以内) |
| | | 1000倍 | 育苗箱 (30×60× 3cm、使用土 壤約5L) 1箱当り1L | は種時 | | | | |
| 稲(湛水 直播) | 苗腐病 (ヒシウム菌) | 2.5～ 5倍 | 乾燥種籾 1kg当り 30mL | は種前 | | 鉄コーテ ィング種 子に吹き 付け処理 | 1回 | 3回以内 (種もみへ の処理は1 回以内、本 田では2回 以内) |