

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ケルシネット及びケルシネットPを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
果樹類(かんきつ、りんご、びわ、いちょう(種子)、くり、キウイフルーツ、食用桑(果実)、さんしょう(果実)を除く)	—	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	3回以内	雑草 茎葉散布	3回以内		
		多年生雑草		500~1000 mL/10a						
かんきつ、りんご、びわ、キウイフルーツ		一年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a						
		多年生雑草		500~1000 mL/10a						
くり		一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a						
		多年生雑草		500~1000 mL/10a						
いちょう(種子)		一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a						
		多年生雑草		500~1000 mL/10a						
食用桑(果実)		一年生雑草	収穫45日前まで (雑草生育期 春期萌芽前及び夏 切り後萌芽前)	300~500 mL/10a						
		多年生雑草		500~1000 mL/10a						
さんしょう(果実)		一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a						
		多年生雑草		500~1000 mL/10a						
そば		一年生雑草	は種前 (雑草生育期)	300~500 mL/10a					3回以内	3回以内
豆類 (種実、ただし、らっ かせいを除く)			収穫28日前まで (雑草生育期 は種・定植前 又は畦間処理)							
			収穫前日まで (雑草生育期 は種・定植前 又は畦間処理)							
豆類 (未成熟、ただし、 えだまめを除く)			収穫14日前まで (雑草生育期 は種・定植前 又は畦間処理)							
えだまめ	雑草生育期 萌芽前処理		100~200 mL/10a	1回	3回以内 (萌芽前は 1回以内、 萌芽後は 2回以内)					
ばれいしょ	収穫21日前まで (雑草生育期 畦間処理)		300~500 mL/10a	2回以内						
	収穫30日前まで (雑草生育期 植付前又は 畦間処理)			3回以内						
さといも	収穫7日前まで (雑草生育期 植付前又は 畦間処理)		300~500 mL/10a		3回以内	3回以内				
さといも (葉柄)										

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルシネット及びゲルシネットPを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
かんしょ	—	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期 挿苗前 又は畦間処理)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	2回以内	雑草 茎葉散布	2回以内		
ごぼう			収穫前日まで (雑草生育期 は種前 又は畦間処理)						3回以内	3回以内
だいこん			収穫45日まで (雑草生育期 畦間処 理)							
やまのいも			収穫30日前まで (雑草生育期 萌芽前 又は畦間処理)			2回以内		2回以内		
いちご、 ピーマン、なす、 トマト、ミニトマ ト、きゅうり、 とうがらし類			収穫前日まで (雑草生育期 定植前 又は畦間処理)							
メロン、レタス、 非結球レタス			収穫30日前まで (雑草生育期 定植前 又は畦間処理)			2回以内		3回以内		
はくさい			収穫45日前まで (雑草生育期 は種・定 植前又は畦間処理)							
キャベツ			収穫45日前まで (雑草生育期 定植前 又は畦間処理)			2回以内		2回以内		
たまねぎ			収穫7日前まで (雑草生育期 定植前 又は畦間処理)							
にんにく			収穫前日まで (雑草生育期 萌芽前 又は畦間処理)			3回以内		2回以内		
にら			収穫前日まで (雑草生育期 畦間処理)							
ねぎ、すいか、 ブロッコリー			収穫前日まで (雑草生育期 定植前 又は畦間処理)			2回以内		2回以内		
アスパラガス		萌芽前 (雑草生育期)								
		一年生雑草 及び多年生 広葉雑草	収穫打切り後 (雑草生育期)	500 mL/10a	3回以内	3回以内				
にんじん		一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期 は種前 又は畦間処理)	300~500 mL/10a	3回以内	3回以内				
ほうれんそう			定植前 (雑草生育期)				2回以内	2回以内		
とうがん			収穫前日まで (雑草生育期 畦間処理)				2回以内	3回以内		

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルホネット及びゲルホネットPを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
しそ	—	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期 畦間処理)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	2回以内	雑草 茎葉散布	2回以内		
みょうが (花穂)			収穫14日前まで (雑草生育期 萌芽前又は 畦間処理)							
みょうが (茎葉)			みょうが(花穂) の収穫14日前まで ただし、 花穂を収穫しない 場合にあっては 開花期終了まで (雑草生育期 萌芽前又は 畦間処理)							
ごま			は種又は定植 9日前まで (雑草生育期)	500 mL/10a	100 L/10a	1回			3回以内 (は種又は定 植後は2回 以内)	
			収穫21日前まで (雑草生育期 畦間処理)			2回以内				
ぎぼうし			収穫90日前まで (雑草生育期 畦間処理)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	3回以内			3回以内	
かのこそう			収穫14日前まで (雑草生育期 定植 前又は畦間処理)			2回以内			2回以内	
甘草						9回以内 (1年間に 3回以内)			9回以内 (1年間に 3回以内)	
ホップ						収穫3日前まで (雑草生育期 畦間処理)			3回以内	3回以内
茶						摘採7日前まで (雑草生育期 畦間処理)			2回以内	2回以内
茶 (幼木)						雑草生育期 畦間・株間処理			300 mL/10a	
さとうきび	圃場内 の周縁 部	一年生雑草 及び 多年生雑草	耕起又は 植付7日前まで (雑草生育期)			300~1000 mL/10a	100 L/10a	1回	4回以内 (植付後は 3回以内)	
			収穫14日前まで (雑草生育期 畦間処理)	3回以内						
			収穫14日前まで (雑草生育期)							
小麦 大麦	—	一年生雑草	耕起又は は種前 (雑草生育期)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	1回	4回以内 (は種後は 3回以内)			
	圃場内 の周縁 部		収穫7日前まで (雑草生育期)			3回以内				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ケルホネット及びケルホネットPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
水田作物	—	一年生雑草	耕起前 (雑草生育期)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	1回	雑草 茎葉散布	1回
水田作物 (水田刈跡)	水田 刈跡		雑草生育期					
水田作物 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生雑草 多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	500~1000 mL/10a		2回以内		2回以内
たばこ	—	一年生雑草	雑草生育期 大土寄期 畦面・畦間処理	200~500 mL/10a	100~200 L/10a	1回	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に雑草 茎葉散布	1回
花き類・ 観葉植物			雑草生育期 畦間処理	300~500 mL/10a				
樹木類			雑草生育期	500~1000 mL/10a				100~200 L/10a
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道 等	多年生雑草			1000~2000 mL/10a			