

2023年6月21日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	シアトラリアロール を含む農薬の 総使用回数
未成熟とう もろこし	ムギケリアブラムシ	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	アヲメカ 材バコ ツヅロカヨトウ	40 倍	2～ 3.2L/10a			無人 航空 機に よる 散布	
		2000～ 4000 倍	100～ 300L/10a			散布	
えだまめ	アブラムシ類	32 倍	1.6～ 2.4L/10a	収穫 7 日 前まで		無人 航空 機に よる 散布	4 回以内 (は種前の処理は 1 回以内、は種後の 処理は 3 回以内)
		2000 倍	100～ 300L/10a			散布	
	2000～ 4000 倍	無人 航空 機に よる 散布					
だいず	ハスモンヨトウ マメシクイカ	32 倍	0.8～ 2.4L/10a	収穫 7 日 前まで	散布		
		2000～ 4000 倍	100～ 300L/10a		無人 航空 機に よる 散布		
	2000 倍	アブラムシ類			32 倍	1.6～ 2.4L/10a	
さやいん げん	ハスモンヨトウ	4000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	ハゲリバエ類	2000 倍					
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカシロシタハ アリトキウムシ イナガシ ヨシカメコハムシ ヒカカメグリカ	4000 倍	1～2L /10a	収穫 7 日 前まで		無人 航空 機に よる 散布	
		40 倍				散布	
ばれい しょ	ハスモンヨトウ	4000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで		無人 航空 機に よる 散布	
	アブラムシ類	40 倍	2～3.2L /10a			散布	
		2000 倍	100～ 300L/10a		無人 航空 機に よる 散布		
やまのいも	カガイモカ ハスモンヨトウ アブラムシ類	4000 倍	1～3L /10a	収穫 7 日 前まで	散布		
		40 倍			無人 航空 機に よる 散布		

2023 年 6 月 21 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	シアントリアゾール を含む農薬の 総使用回数						
だいこん	アブラムシ類 ハモグリハエ類 キスジノミハムシ	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (は種時までの処理 は 1 回以内、は種後 の処理は 3 回以内)						
	ヨトウムシ	4000 倍											
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ カブラハチ類 ダイコンハムシ	2000～ 4000 倍											
	アブラムシ類 ハモグリハエ類 キスジノミハムシ ヨトウムシ	20 倍	1～2L /10a										
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウリバ類	2000～ 4000 倍	100～ 300L/10a			収穫前日 まで		3 回以内	散布	4 回以内 (定植時までの処理 は 1 回以内、定植 後の散布は 3 回以内)			
	アブラムシ類 キスジノミハムシ	2000 倍											
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウリバ類 オオタバコガ シロイチモンズヨトウ	2000～ 4000 倍	1～2L /10a						収穫前日 まで		3 回以内	無人 航空 機に よる 散布	4 回以内 (定植時までの処理 は 1 回以内、定植 後の処理は 3 回以内)
	アザミウマ類 アブラムシ類	20 倍											
		2000 倍											
ブロッコリー	アオムシ ハスモンヨトウ コナガ シロイチモンズヨトウ	2000～ 4000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内		散布					4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の処理は 3 回以内)	
	アザミウマ類 アブラムシ類	20 倍	1～2L /10a				無人 航空 機に よる 散布						
		2000 倍											
レタス 非結球レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ウリバ類	2000～ 4000 倍	100～ 300L/10a			収穫前日 まで	3 回以内	散布		3 回以内			
	ハモグリハエ類 アブラムシ類	2000 倍											

2023 年 6 月 21 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
ねぎ	シロイモシヨトウ アザミウマ類 ハモグリバエ類	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (定植時までの処理 は 1 回以内、 定植後の処理は 3 回以内(但し、 株元灌注は 1 回以内))
		20 倍	1～2L /10a			無人 航空 機に よる 散布	
たまねぎ	ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ シロイモシヨトウ	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 14 日 前まで		散布	3 回以内
		20 倍	1～2L /10a			無人 航空 機に よる 散布	
	アザミウマ類	2000～ 4000 倍	100～ 300L/10a			散布	
にんにく	アザミウマ類 アブラムシ類	2000 倍	1～2L /10a	収穫 7 日前 まで		無人 航空 機に よる 散布	
		20 倍					
アスパラガス	ハスモンヨトウ	4000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで		3 回以内	散布
にんじん	アブラムシ類	2000 倍					
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ キアゲハ	4000 倍					
トマト ミニトマト	オオタバコガ	2000～ 4000 倍					
	ハモグリバエ類 コナジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類 トキバガ	2000 倍					
ピーマン	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	2000～ 4000 倍					
	オオタバコガ						
ししとう	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	2000 倍					
	オオタバコガ	2000～ 4000 倍					

2023 年 6 月 21 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ウリメカイ	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (定植時までの 処理及び定植 直後の株元灌注 は合計 1 回以内、 定植後の散布は 3 回以内)
かぼちゃ	ハモグリバエ類	20 倍	1～2L/10a				無人 航空 機に よる 散布
	ハスモンヨトウ			4000 倍			
オクラ	アブラムシ類	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫開始3 日前まで	3 回以内	散布	
いちご	ハスモンヨトウ	2000～ 4000 倍		収穫前日 まで			4 回以内 (灌注は 1 回以内、 散布は 3 回以内)
	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類	2000 倍					
たばこ	ヨトウムシ タバコノミハムシ	4000 倍	100～ 180L/10a	収穫 10 日 前まで	2 回以内	2 回以内	