

新規作用性 殺虫剤

明治 ファインセーブ® フロアブル

アザミウマ類に特効的・サビダニ類にも高い効果

併せて、タバココナジラミ類、小型のチョウ目害虫にも有効

新規作用機作で既存剤に感受性の低下した害虫に有効

ミトコンドリア電子伝達系複合体III Qiを阻害する

天敵・有用昆虫に対する影響が小さい

ミツバチ・マルハナバチ・カブリダニ類等に対して影響が小さい

極めて高い速効性・優れた残効性



適用拡大

かんきつ：チャノホコリダニ

しそ(花穂)・みょうが(花穂・莖葉)：アザミウマ類

アスパラガス・ししとう：タバココナジラミ類





有効成分：フロメトキン……………10.0%
 その他成分：水、界面活性剤等……………90.0%
 性状：類白色水和性粘稠懸濁液体
 毒性：医薬用外劇物

適用害虫の一例



ミナミキイロアザミウマ ミカンキイロアザミウマ ネギアザミウマ チャノキイロアザミウマ ヒラズハナアザミウマ
 トマトサビダニ ミカンサビダニ コナガ チャノホソガ タバココナジラミ

適用害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロメトキンを含む農業の総使用回数
かんきつ	アザミウマ類 ミカンサビダニ チャノホコリダニ	2000~4000倍	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
マンゴー	アザミウマ類	2000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
なす、ピーマン ししとう	タバココナジラミ類 ※	1000倍			2回以内		2回以内
しよくようほおずき パプリカ、にんにく	アザミウマ類	2000倍			3回以内		3回以内
トマト ミニトマト	アザミウマ類 タバココナジラミ類 ※ トマトサビダニ	1000~2000倍 1000~4000倍	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内		2回以内
すいか、いちご	アザミウマ類	1000~2000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内
はくさい	アオムシ コナガ	1000倍			収穫3日前まで		2回以内
キャベツ	コナガ アザミウマ類 アオムシ	1000~2000倍 1000倍		収穫3日前まで			3回以内
きく(業) なら、食用ぎく しそ しそ(花穂)	アザミウマ類	2000倍			収穫3日前まで		2回以内
ブロッコリー カリフラワー	アオムシ アザミウマ類	1000倍		収穫14日前まで			3回以内
だいごん	コナガ	1000~2000倍			収穫3日前まで	2回以内	2回以内
ねぎ	アザミウマ類 ネギハモグリバエ	2000倍		収穫3日前まで		3回以内	3回以内
わけぎ あざつき	アザミウマ類 ネギハモグリバエ	1000~2000倍			収穫14日前まで	2回以内	2回以内
たまねぎ	アザミウマ類	2000倍		収穫前日まで		3回以内	3回以内
ほうれんそう	アザミウマ類	2000倍	100~800ℓ/10a		2回以内	散布	2回以内
アスパラガス	タバココナジラミ類※	2000倍					
みょうが(花穂)	アザミウマ類	1000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布 但し、花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。	3回以内
みょうが(茎葉)	アザミウマ類	1000倍		みょうが(花穂)の収穫前日まで但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで	2回以内		
茶	チャノホソガ チャノキイロアザミウマ	2000~4000倍 1000~4000倍	200~400ℓ/10a	摘採14日前まで	2回以内	散布	2回以内
きく	アザミウマ類	2000倍	100~300ℓ/10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内

※ シルバーリーフコナジラミを含む

使い方のポイント ● 散布ムラがないように散布してください。 ● 抵抗性の発達を抑えるため、連用はさけてください。 ● 使用する前に容器を良く振ってください。

△ 効果・被害等の注意

- 使用前によく振ってください。
- かけむらのないように葉の表裏に十分散布してください(効果)
- 桑葉にかからないように注意してください(蚕毒)
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してください。使用方法等を厳守してください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

△ 安全使用上の注意

- 医薬用外劇物。取扱いは十分に注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に異常を感じた時は、直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布時は、防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして、衣服を換えてください。作業時の衣服などは他と分けて洗濯してください。
- かぶれやすい人は取扱いは十分に注意してください。
- 施設内で使用する場合、窓等を開放し、十分に換気した後に入室してください。

魚毒性等…水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
 河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください(甲殻類)
 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管…密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、涼涼な所に保管してください。カギをかけてください。
 盗難・紛失の際は、警察に届け出てください。

火災時の措置…火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
漏出時の措置…漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
輸送上の注意…移送取扱いは、ていねいに行ってください。
廃棄上の注意…使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手が届くところには置かないでください。● 空容器は圃場等に放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。● 防除日誌に記録しましょう。

お問い合わせ / ご注文は