

サンエース箱粒剤（第 2 4 1 2 5 号）

2024 年 7 月 24 日現在

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法
稲 （箱 育苗）	いもち病 紋枯病 稲こうじ病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病 穂枯れ （ごま葉枯病菌） 墨黒穂病 イネノオミシ イネズヅウムシ コブノメイガ ツマグロヨコバイ ウカ類 ニカメイチュウ フタホシコヤガ イネツトムシ	育苗箱 （30×60× 3cm、使用 土壌約5L） 1箱当り50g	移植3日前～ 移植当日	1回	育苗箱の 上から均一に 散布する。
		高密度には 種する場合 は1kg/10a （育苗箱 （30×60× 3cm、使用 土壌約5L） 1箱当り 50～100g）			
稲	いもち病 イネノオミシ イネズヅウムシ ウカ類	1kg/10a	移植時		側条施用

クワントラニプロールを含む 農薬の総使用回数	トリフルメゾピリムを含む 農薬の総使用回数	シメコナゾールを含む 農薬の総使用回数	トルブ・カルブを含む 農薬の総使用回数
1回	1回	2回以内 （移植時までの処理は 1回以内）	2回以内 （移植時までの処理は 1回以内、本田での 湛水散布、無人航空機 散布、投げ入れは合計 1回以内）