

Water Dispersible Granules (WDG) are promptly dissolved and dispersed into water.

WDGs are safer than wettable powder, due to less dust production during handling.

果樹用殺菌剤 フルーツガード[®] WDG

キャプタン

ペンチオピラド

作用性の異なる二つの成分を配合した果樹用殺菌剤です。
幅広い病害を防除し、薬剤の感受性低下防止にも寄与します。

幅広い病害スペクトラム

優れた予防効果

他の有効成分に
耐性を獲得した病害に対して有効



フルーツガードは三井化学クロップ&ライフソリューション(株)の登録商標です。

果樹用殺菌剤

フルーツガード[®] WDG

農林水産省登録 第24191号 殺菌剤分類 M4,7

成 分：キャプタン 70.0%

ベンチオピラド 7.5%

鉱物質微粉等 22.5%

性 状：淡褐色水和性細粒 毒 性：普通物*

*「毒物および劇物取扱法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

キャプタン混合剤の中で汚れの少ないWDG製剤

水和剤と比べて汚れが少ない製剤です

キャプタン

ベンチオピラド

病原菌に対する作用点が多岐にわたるため、広範囲の病害に安定した予防効果を示す殺菌剤。薬剤耐性発達リスクが低く、日本のみならず、海外においても長年にわたって広く使用されている殺菌剤です。

担子菌、子囊菌、不完全菌に属する幅広い植物病原菌に対して高い活性を示す殺菌剤(SDHI剤)。分生胞子の発芽阻害に特に優れ、病害の発病前から発病初期の散布で安定した効果を発揮します。

適用病害と使用方法

2024年11月13日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数	ベンチオピラドを含む農薬の総使用回数
なし	黒星病 輪紋病 炭疽病 うどんこ病 褐色斑点病 赤星病 黒斑病	1000倍	200~700ℓ /10a	収穫 3日前まで	3回以内	散布	9回以内	3回以内
りんご	灰色かび病 斑点落葉病 黒点病 褐斑病 炭疽病 輪紋病 うどんこ病 黒星病 モニリア病 すす点病 すす斑病 赤星病	1000倍	200~700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	6回以内	3回以内
ぶどう	灰色かび病 褐斑病 晚腐病 黒とう病 さび病 べと病 うどんこ病	800倍	200~700ℓ /10a	収穫 30日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
かき	うどんこ病 灰色かび病 落葉病 炭疽病 すす点病	1000倍	200~700ℓ /10a	収穫 7日前まで	3回以内	散布	5回以内	3回以内

△ 効果・薬害等の注意

● 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。● ボルドー液、石灰硫黄合剤等のアルカリ性薬剤及びマシン油乳剤との混用はさけてください。● 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。● なしに使用する場合は、開花初めから落花後20日頃までの散布は新葉に薬害を生じるおそれがあるので使用をさけ、6月中旬以降に使用してください。● ぶどうの幼果期(小豆大)以降の散布は、果粉が溶脱するおそれがあるので使用をさ

けてください。● 雨よけ栽培のぶどうに使用する場合は、ビニール被覆の除去後に葉焼けを生じるおそれがあるので注意してください。● 高樹齢のかきに使用の際、樹勢が弱い場合には、葉脈の黒変と葉に赤黃化を伴う落葉を生じるおそれがあるので注意してください。● 蚊に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかかるないようにしてください。● 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

△ 安全使用上の注意

● 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください(刺激性)。● 皮膚に付着しないように注意してください。皮膚に付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください(刺激性)。● 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用。魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください(魚類)。使用残りの薬液が生じないように調製し、使いきってください。散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

して下さい。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼、うがいをして、衣服を換えてください。作業時の衣服などは他と分けて洗濯してください。● かぶれやすい体质の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさせてください。● 夏期高温時の使用をさせてください。● 桑葉にかかるないように注意してください(蚕毒)保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所に保管してください。

使用前にはラベルをよく読んでください。ラベルの記載以外には使用しないでください。本剤は小児の手の届く所に置かないでください。空袋は圃場などに放置せず適切に処理してください。

・ 本製品は農業用殺菌剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
・ 本印刷物は2024年11月13日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまで測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

取扱い



三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社

東京都中央区日本橋1-19-1日本橋ダイヤビルディング
ホームページ https://www.mc-croplifesolutions.com