

長期持続型殺虫殺菌剤

ファーストオリゼ® リディア

粒剤

共に、
未来を
切り拓こう。



イネツトムシ
にも
効果あり!



は種と同時にいもち病・害虫を防除!

新規殺虫成分(フルピリミン)と、信頼と実績の殺菌剤(プロベナゾール)を配合。

いもち病・初期害虫を始め、ウンカ類、チョウ目害虫、イナゴ類などに安定した高い効果を発揮。



殺虫剤分類	4F
殺菌剤分類	P2

ファーストオリゼ、リディアは三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社の登録商標です。

長期持続型殺虫殺菌剤 ファーストオリゼリディア[®]粒剤

有効成分：フルピリミン…2.0% プロベナゾール…20.0%
人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

- 1 期待の新規殺虫成分「フルピリミン」と、信頼と実績の殺菌成分「プロベナゾール」を配合**
2つの成分の働きにより、病気と害虫を同時ブロック。いもち病を始め、水稻初期害虫、ウンカ類、チョウ目害虫、イナゴ類などの害虫に高い効果を発揮!
- 2 は種前・は種時の専用剤!**
「は種前(床土混和)」または「は種時(覆土前)」処理に最適な製剤で、長期間にわたって効果を示します。
- 3 新規殺虫成分「フルピリミン」はミツバチへの影響が小さい!!**
ミツバチのほか、多くの有用昆虫や天敵類に対して影響はほとんどありません。

適用病害虫と使用方法


2024年6月12日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルピリミンを含む農薬の総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 もみ枯細菌病 白葉枯病 イネミズゾウムシ イネドロオウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ イナゴ類 フタオビコヤガ ニカメイチュウ イネツトムシ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の 床土に均一に 混和する。	3回以内 (移植時までの 処理は1回以内、 本田では 2回以内)	2回以内 (移植時までの 処理は1回以内)
	いもち病 穂枯れ(こま葉枯病菌) もみ枯細菌病 白葉枯病 イネミズゾウムシ イネドロオウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ イナゴ類 フタオビコヤガ ニカメイチュウ イネツトムシ	高密度に は種する場合は 1kg/10a 育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り50~100g	は種時 (覆土前)		育苗箱の 床土に均一に 散布する。		

試験成績


●いもち病

品 種：ササニシキ
播 種 日：4月20日
移 植 日：5月16日
処 理 日：4月19日(床土混和)
発生状況：葉いもち(少発生)
(無処理の病斑数は
1.42個/株)
調 査 日：7月24日(葉いもち)
調査方法：
葉いもちは、各区中央部40株について株当りの病斑数を調査。



●イネミズゾウムシ

品 種：コシヒカリ
播 種 日：4月14日
移 植 日：5月10日
処 理 日：4月14日(は種時覆土前)
発生状況：多発生
調 査 日：6月20日(移植41日後)
調査方法：
根圏部位に生息している幼虫・蛹の数を調査。



ファーストオリゼリディア粒剤は各病害虫に対し、高い防除効果が認められた。

●使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空袋・空容器は畑や水路などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌をつけましょう。

お問い合わせ/ご注文は



**三井化学クロップ&ライフ
ソリューション株式会社**

東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <https://www.mc-croplifesolutions.com>

FOLA-001 Zenshin 2407