

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	プロフレア® を含む 農薬の総 使用回数
未成熟とうもろこし	アワノメイガ ツマジロクサヨトウ	2000～ 4000 倍	100～ 300L /10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回 以内
キャベツ	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ オオタバコガ ウワバ類 ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ						
はくさい	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ オオタバコガ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 キスジノミハムシ ダイコンハムシ シロイチモジヨトウ						
だいこん	コナガ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ カブラハバチ類 アオムシ ダイコンハムシ						
かぶ	コナガ キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ アオムシ ハスモンヨトウ ダイコンハムシ						
はなやさい類	アオムシ オオタバコガ コナガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ウワバ類 ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ						
非結球あぶらな科 葉菜類	コナガ アオムシ キスジノミハムシ						
レタス類	ハスモンヨトウ ヨトウムシ オオタバコガ ウワバ類 シロイチモジヨトウ						
ねぎ	ネギコガ シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ						
アスパラガス	オオタバコガ ジュウシホシクビナガハムシ ハスモンヨトウ		100～ 800L /10a				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロフレアSCを含む農薬の総使用回数
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、そらまめを除く)	ハスモンヨトウ	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、未成熟そらまめ、さやえんどうを除く)							
だいず	ハスモンヨトウ オオタバコガ ダイズサヤタマバエ フタスジヒメハムシ	16～32倍	0.8～1.6L/10a			無人航空機による散布	
		2000～4000倍	100～300L/10a				
えだまめ	ハスモンヨトウ オオタバコガ ダイズサヤタマバエ フタスジヒメハムシ マメシクイガ ツメクサガ ウコンノメイガ シロイチモジヨトウ マメハンミョウ	16～32倍	0.8～1.6L/10a			無人航空機による散布	
いんげんまめ そらまめ 未成熟そらまめ えんどうまめ さやえんどう	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	2000～4000倍	100～300L/10a			散布	
あずき	ハスモンヨトウ アズキノメイガ						
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ ヨツモンカメノコハムシ ヒルガオハモグリガ エビガラスズメ シロイチモジヨトウ イモコガ	16～32倍	0.8～1.6L/10a			無人航空機による散布	
さといも	ハスモンヨトウ	2000～4000倍	100～300L/10a	散布			
てんさい	ヨトウムシ			収穫7日前まで			
きく	ハスモンヨトウ オオタバコガ			発生初期			