

| 作物名             | 適用病害虫名  | 希釈<br>倍数        | 使用<br>液量             | 使用<br>時期   | 本剤<br>の<br>使用<br>回数 | 使用<br>方法 | プロフレア®<br>を含む<br>農薬の総<br>使用回数 |
|-----------------|---|-----------------|----------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------------|
| 未成熟とうもろこし       | アワノメイガ<br>ツマジロクサヨトウ   | 2000～<br>4000 倍 | 100～<br>300L<br>/10a | 収穫前日<br>まで | 3 回<br>以内           | 散布       | 3 回<br>以内                     |
| キャベツ            | コナガ<br>アオムシ<br>ハスモンヨトウ<br>ヨトウムシ<br>オオタバコガ<br>ウワバ類<br>ハイマダラノメイガ<br>シロイチモジヨトウ                           |                 |                      |            |                     |          |                               |
| はくさい            | コナガ<br>アオムシ<br>ハスモンヨトウ<br>ヨトウムシ<br>オオタバコガ<br>ハイマダラノメイガ<br>カブラハバチ類<br>キスジノミハムシ<br>ダイコンハムシ<br>シロイチモジヨトウ |                 |                      |            |                     |          |                               |
| だいこん            | コナガ<br>ヨトウムシ<br>ハイマダラノメイガ<br>キスジノミハムシ<br>カブラハバチ類<br>アオムシ<br>ダイコンハムシ                                   |                 |                      |            |                     |          |                               |
| かぶ              | コナガ<br>キスジノミハムシ<br>ハイマダラノメイガ<br>アオムシ<br>ハスモンヨトウ<br>ダイコンハムシ  |                 |                      |            |                     |          |                               |
| はなやさい類          | アオムシ<br>オオタバコガ<br>コナガ<br>ハスモンヨトウ<br>ヨトウムシ<br>ウワバ類<br>ハイマダラノメイガ<br>シロイチモジヨトウ                           |                 |                      |            |                     |          |                               |
| 非結球あぶらな科<br>葉菜類 | コナガ<br>アオムシ<br>キスジノミハムシ   |                 |                      |            |                     |          |                               |
| レタス類            | ハスモンヨトウ<br>ヨトウムシ<br>オオタバコガ<br>ウワバ類<br>シロイチモジヨトウ   |                 |                      |            |                     |          |                               |
| ねぎ              | ネギコガ<br>シロイチモジヨトウ<br>ネギハモグリバエ   |                 |                      |            |                     |          |                               |
| アスパラガス          | オオタバコガ<br>ジュウシホシクビナガハムシ<br>ハスモンヨトウ<br>シロイチモジヨトウ<br>ヨトウムシ  |                 | 100～<br>800L<br>/10a |            |                     |          |                               |

| 作物名                                      | 適用病害虫名   | 希釈<br>倍数        | 使用<br>液量             | 使用<br>時期   | 本剤<br>の<br>使用<br>回数 | 使用<br>方法             | プロフレア®<br>を含む<br>農薬の総<br>使用回数 |
|--|--|-----------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、そらまめを除く) | ハスモンヨトウ  | 2000～<br>4000 倍 | 100～<br>300L<br>/10a | 収穫前日<br>まで | 3 回<br>以内           | 散布                   | 3 回<br>以内                     |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、未成熟そらまめ、さやえんどうを除く)       |  |                 |                      |            |                     |                      |                               |
| だいず<br>えだまめ                              | ハスモンヨトウ<br>オオタバコガ<br>ダイズサヤタマバエ<br>フタスジヒメハムシ<br>マメシクイガ<br>ツメクサガ                 | 16～<br>32 倍     | 0.8～<br>1.6L/<br>10a |            |                     | 散布                   |                               |
|  | ウコンノメイガ<br>シロイチモジヨトウ<br>マメハンミョウ  | 2000～<br>4000 倍 | 100～<br>300L<br>/10a |            |                     |                      |                               |
| いんげんまめ<br>そらまめ<br>未成熟そらまめ                | ハスモンヨトウ<br>シロイチモジヨトウ   | 2000～<br>4000 倍 | 100～<br>300L<br>/10a |            |                     | 散布                   |                               |
| えんどうまめ<br>さやえんどう                         | ハスモンヨトウ<br>シロイチモジヨトウ<br>ヨトウムシ<br>ウラナミシジミ                                       |                 |                      |            |                     |                      |                               |
| あずき                                      | ハスモンヨトウ<br>アズキノメイガ   |                 |                      |            |                     |                      |                               |
| かんしょ                                     | ハスモンヨトウ<br>ナカジロシタバ<br>ヨツモンカメノコハムシ<br>ヒルガオハモグリガ<br>エビガラスズメ<br>シロイチモジヨトウ<br>イモコガ |                 |                      |            |                     |                      |                               |
|  | さといも   | ハスモンヨトウ         | 2000～<br>4000 倍      |            |                     | 100～<br>300L<br>/10a |                               |
| てんさい                                     | ヨトウムシ<br>シロオビノメイガ<br>カメノコハムシ   | 収穫7日<br>前まで     |                      |            |                     |                      |                               |
| きく                                       | ハスモンヨトウ<br>オオタバコガ  |                 |                      | 発生初期       |                     |                      |                               |