

ビルダーリディア箱粒剤（第 24483 号）

2024 年 7 月 10 日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	フルピリミンを含 む農薬の総使用回 数	プロベナゾ ールを含む 農薬の 総使用回数
稲	いもち病 イネトモイシ イネミズゾウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ	1kg/10a	移植時	1 回	側条施用	3 回以内 (直播での種時 又は移植時までの 処理は 1 回以内、 本田では2回以内)	2 回以内 (移植時までの 処理は 1 回 以内)
稲 (箱育苗)	いもち病 イネトモイシ イネミズゾウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50g	移植 7 日前 ～移植当日		育苗箱の上 から均一に 散布する。	3 回以内 (移植時までの処 理は 1 回以内、本 田では 2 回以内)	
	白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イナコ類 イネツトムシ						
	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネトモイシ イネミズゾウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネツトムシ イナコ類	高密度には種す る場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L)1 箱当り 50~100g)	移植 3 日前 ～移植当日				