

GPオリゼリディア箱粒剤 (第24506号)

2023年10月25日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルピリミンを含む農薬の総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 いぼもいん いぼもいん ウカ類 ツマグロヨコバイ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50g	緑化期～ 移植当日	1回	育苗箱の 苗の上から均一に 散布する。	3回以内 (移植時までの 処理は1回以 内、本田では 2回以内)	2回以内 (移植時ま での処理は 1回以内)
	もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) コメイチュ 付コ類 いぼらバエ いぼもいん フタヒコヤガ いぼもいん		移植3日前 ～移植当日				
	いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) ウカ類 ツマグロヨコバイ いぼもいん いぼもいん コメイチュ 付コ類 いぼらバエ いぼもいん フタヒコヤガ いぼもいん	高密度には 種する場合 は1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1箱当り 50～100g)					
稲	いもち病 いぼもいん いぼもいん コメイチュ	1kg/10a	移植時		側条施用	3回以内 (直播では種 時又は移植時 までの処理は 1回以内、本田 では2回以内)	
湛水直播 水稻	いもち病		は種時		は種同時 施薬機を 用いて土 中施用す る。	3回以内 (は種時までの 処理は1回以 内、本田では2 回以内)	2回以内 (は種時ま での処理は1 回以内)