

登録番号 第 24595 号

側条オリゼメート®リディア®顆粒水和剤

- 特長：
- 側条施用でいもち病と水稲初期害虫の同時防除が可能です。
 - 田植・施肥・薬剤施用を同時におこなうことができ、極めて省力的です。

オリゼメート、リディアは三井化学クロップ&ライフソリューション(株)の登録商標です。

有効成分	フルピリミン・・・4.0% プロベナゾール(化管法第1種)・・・48.0%	包装	500g×20
性状	淡褐色水和性細粒	有効年限	4年
毒性	普通物*	危険物	-

※普通物：「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

【適用病害虫及び使用方法】

2023年4月1日付内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルピリミンを含む農薬の総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 いもち病	500g/10a	移植時	1回	ペースト肥料に混合し側条施肥田植機で施用する。	3回以内 (直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)	2回以内 (移植時までの処理は1回以内)

農薬の使用上の注意事項

- (1) 使用量に合わせて秤量し、使いきること。
- (2) 予め本剤を同重量の水に混ぜ、これをペースト肥料に加えて均一に混合し、側条施肥田植機で本田に施用すること。
- (3) 本剤と混合したペースト肥料は、その日のうちに使用すること。
- (4) 同一の病害虫を防除対象とする育苗施用薬剤とは併用しないこと。
- (5) 移植後は湛水状態(湛水深3~5cm)を保ち、稲苗が活着するまで田面が露出しないよう水管理に注意すること。
- (6) 本田が砂質土壌の水田や漏水田、未熟有機物多用田の場合には使用をさけること。
- (7) 移植後、低温が続く、苗の活着遅延が予測される場合は使用をさけること。
- (8) 容器・空袋はほ場などに放置せず、適切に処理すること。
- (9) 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

人畜に有毒な農薬については、その旨、使用に際して講ずべき被害防止方法及び解毒方法

- (1) 人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法農薬使用者に係る注意事項
 - 1) 誤飲、誤食などのないよう注意すること。
 - 2) 使用の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換すること。
 - 3) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
 - 4) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけること。
 - 5) 夏期高温時の使用をさけること。

- (2) 使用に際して講ずべき被害防止方法
該当なし

生活環境動植物に有毒な農薬については、その旨-----

- (1) 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。
(2) 使用後は河川、養殖池等に流入しないよう、水管理に注意すること。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨-----

通常の使用方法ではその該当がない。

農薬の貯蔵上の注意事項-----

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。