

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フロートキンを 含む農薬の 総使用回数
かんきつ	—	ミカンサビダニ チャノホコリダニ	2000～4000 倍	200～700 L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
もも マンゴー		アザミウマ類	2000 倍					
ぶどう		ブドウサビダニ						
なす		タバコナジラミ類 (シルバーリーフコナ ジラミを含む)	1000 倍		100～300 L/10a			
	温室、ガラス室、 ビニールハウス等の 密閉できる場所	アザミウマ類	1000～2000 倍	10L/10a				
ししとう	—	タバコナジラミ類 (シルバーリーフコナ ジラミを含む)	1000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
		アザミウマ類	1000～2000 倍					
トマトサビダニ		1000～4000 倍						
アザミウマ類 タバコナジラミ類 (シルバーリーフコナ ジラミを含む)		1000～2000 倍						
ピーマン		タバコナジラミ類 (シルバーリーフコナ ジラミを含む)	1000 倍					
すいか いちご		アザミウマ類	1000～2000 倍					
はくさい		アオムシ	1000 倍					
		コナガ	1000～2000 倍					
キャベツ		アザミウマ類						
		アオムシ	1000 倍					
ブロッコリー カリフラワー		アザミウマ類						
だいこん		コナガ	1000～2000 倍					
こまつな		コナガ アザミウマ類	2000 倍					
非結球あぶらな 科葉菜類（こま つなを除く）		コナガ						
レタス		アザミウマ類	1000 倍					
にら		アザミウマ類 タバコナジラミ類 (シルバーリーフコナ ジラミを含む)	2000 倍		100～800 L/10a	収穫前日 まで		
アスパラガス	100～300 L/10a							
わけぎ あさつき				収穫 3 日前 まで				
ねぎ	アザミウマ類				1000～2000 倍			
たまねぎ								

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	70メキンを含む農薬の総使用回数
にんにく	—	アザミウマ類	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
きく（葉）					収穫 3 日前まで			
しそ					収穫前日まで	3 回以内		3 回以内
バジル					2 回以内	2 回以内		
ほうれんそう			収穫 14 日前まで					
未成熟そらまめ			収穫前日まで	2 回以内				
さやいんげん								
しよくようほおずき								
みょうが（茎葉）			温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所	1000 倍		みょうが（花穂）の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合 については開花期終了まで		3 回以内
			33 倍	10L/10a				
みょうが（花穂）	—	アザミウマ類	1000 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。	3 回以内
	温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所		33 倍	10L/10a			常温煙霧、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により煙霧が直接花穂に飛散しない状態で使用する。	
しそ(花穂)	—	アザミウマ類	2000 倍	100～300 L/10a	収穫 3 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
食用ぎく								
茶		チャノホリガ	2000～4000 倍	200～400 L/10a	摘採 7 日前まで	2 回以内		
		チャノキイロアザミウマ	1000～4000 倍					
きく		アザミウマ類	2000 倍	100～300 L/10a	発生初期	2 回以内		
グロリア			1000 倍					
ダリア								
ラナンキュラス								
ほおずき								
トルコギキョウ								