

2025 年 2 月 10 日現在

| 作物名              | 適用場所                             | 適用病害虫名                                      | 希釈倍数        | 使用液量             | 使用時期             | 本剤の使用回数          | 使用方法          | フロートキンを含む農薬の総使用回数 |         |               |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------|---------------|
| かんきつ             | —                                | ミカンサビダニ<br>チャノホコリダニ                         | 2000～4000 倍 | 200～700<br>L/10a | 収穫 7 日前<br>まで    | 2 回以内            | 散布            | 2 回以内             |         |               |
| もも<br>マンゴー       |                                  | アザミヤ類                                       | 2000 倍      |                  |                  |                  |               |                   |         |               |
| ぶどう              |                                  | ブドウサビダニ                                     |             |                  |                  |                  |               |                   |         |               |
| なす               |                                  | タバココナジラミ類<br>(シルバーリーフコナ<br>ジラミを含む)          | 1000 倍      |                  |                  | 100～300<br>L/10a |               |                   |         |               |
|                  | 温室、ガラス室、<br>ビニールハウス等の<br>密閉できる場所 | アザミヤ類                                       | 1000～2000 倍 | 10L/10a          |                  | 常温<br>煙霧         |               |                   |         |               |
| ししとう             | —                                | タバココナジラミ類<br>(シルバーリーフコナ<br>ジラミを含む)          | 1000 倍      | 100～300<br>L/10a | 収穫前日<br>まで       | 3 回以内            |               | 3 回以内             |         |               |
| トマト<br>ミニトマト     |                                  | アザミヤ類                                       | 1000～2000 倍 |                  |                  |                  |               |                   | トマトサビダニ | 1000～4000 倍   |
|                  |                                  | アザミヤ類<br>タバココナジラミ類<br>(シルバーリーフコナ<br>ジラミを含む) | 1000～2000 倍 |                  |                  |                  |               |                   |         |               |
| ピーマン             |                                  | タバココナジラミ類<br>(シルバーリーフコナ<br>ジラミを含む)          | 1000 倍      |                  |                  |                  |               |                   |         |               |
| すいか<br>いちご       |                                  | アザミヤ類                                       | 1000～2000 倍 |                  |                  |                  |               |                   |         |               |
| はくさい             |                                  | アオムシ                                        | 1000 倍      |                  |                  |                  |               |                   |         | 収穫 7 日前<br>まで |
|                  |                                  | コナガ                                         | 1000～2000 倍 |                  |                  |                  |               |                   |         |               |
| キャベツ             |                                  | アザミヤ類                                       | 1000 倍      |                  | 収穫 3 日前<br>まで    |                  |               |                   |         |               |
| ブロッコリー<br>カリフラワー |                                  | アオムシ                                        |             |                  |                  |                  |               |                   |         |               |
| だいこん             |                                  | コナガ                                         | 1000～2000 倍 |                  | 収穫 14 日前<br>まで   |                  |               |                   |         |               |
| 非結球あぶらな<br>科葉菜類  |                                  |                                             | 2000 倍      |                  | 収穫 7 日前<br>まで    |                  |               |                   |         |               |
| レタス              |                                  | アザミヤ類                                       | 1000 倍      |                  | 収穫 3 日前<br>まで    |                  |               |                   |         |               |
| にら               |                                  | アザミヤ類<br>タバココナジラミ類<br>(シルバーリーフコナ<br>ジラミを含む) | 2000 倍      |                  | 100～800<br>L/10a | 収穫前日<br>まで       |               |                   |         |               |
| アスパラガス           |                                  |                                             |             |                  | 100～300<br>L/10a |                  | 収穫 3 日前<br>まで |                   |         |               |
| わけぎ<br>あさつき      |                                  |                                             |             | アザミヤ類            |                  |                  |               |                   |         |               |
| ねぎ               |                                  |                                             |             | ネギハモグリバエ         |                  |                  |               |                   |         |               |
| たまねぎ             |                                  | アザミヤ類                                       | 1000～2000 倍 |                  | 3 回以内            | 3 回以内            |               |                   |         |               |

| 作物名       | 適用場所                     | 適用病害虫名      | 希釈倍数   | 使用液量          | 使用時期                                      | 本剤の使用回数    | 使用方法          | フロムキンを含む農薬の総使用回数 |            |
|-----------|--------------------------|-------------|--------|---------------|-------------------------------------------|------------|---------------|------------------|------------|
| にんにく      | —                        | アザミウマ類      | 2000 倍 | 100～300 L/10a | 収穫前日まで                                    | 2 回以内      | 散布            | 2 回以内            |            |
| きく（葉）     |                          |             |        |               | 収穫 3 日前まで                                 |            |               |                  |            |
| しそ        |                          |             |        |               | 収穫前日まで                                    |            |               |                  | 3 回以内      |
| バジル       |                          |             |        |               | 2 回以内                                     | 2 回以内      |               | 2 回以内            |            |
| ほうれんそう    |                          |             |        |               |                                           |            |               |                  | 収穫 14 日前まで |
| さやいんげん    |                          |             |        |               |                                           |            |               |                  | 収穫前日まで     |
| しよくようほおずき |                          |             |        |               |                                           |            |               |                  |            |
| みょうが（茎葉）  | 温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所 |             | 1000 倍 | 10L/10a       | みょうが（花穂）の収穫前日まで<br>但し、花穂を収穫しない場合には開花期終了まで | 3 回以内      | 常温煙霧          | 3 回以内            |            |
| みょうが（花穂）  | —                        |             | 1000 倍 |               |                                           |            | 100～300 L/10a |                  | 収穫前日まで     |
|           |                          |             |        | 33 倍          | 10L/10a                                   |            |               |                  |            |
|           | しそ（花穂）                   |             | —      | 2000 倍        | 100～300 L/10a                             |            | 収穫 3 日前まで     |                  | 2 回以内      |
| 食用ぎく      |                          |             |        |               |                                           |            |               |                  |            |
| 茶         | チャノホソガ                   |             |        | 2000～4000 倍   | 200～400 L/10a                             | 摘採 14 日前まで | 2 回以内         |                  |            |
|           | チャノキイロアザミウマ              | 1000～4000 倍 |        |               |                                           |            |               |                  |            |
| きく        | アザミウマ類                   | 2000 倍      |        | 100～300 L/10a | 発生初期                                      |            |               |                  |            |
| グロリオサ     |                          | 1000 倍      |        |               |                                           |            |               |                  |            |
| ダリア       |                          |             |        |               |                                           |            |               |                  |            |
| ランキュラス    |                          |             |        |               |                                           |            |               |                  |            |
| ほおずき      |                          |             | 2000 倍 |               |                                           |            |               |                  |            |