

水稻用殺虫殺菌剤

リディア[®]EV

箱粒剤

前人未踏の、その先へ。

新規殺虫成分
(フルピリミン)
を配合!



水稻害虫と紋枯病に高い効果!!

は種時覆土前～移植当日の育苗箱施用、移植時側条施用が可能!
新規殺虫成分「フルピリミン」は、ミツバチへの影響が小さい!!



水稻用殺虫殺菌剤

リディアEV[®]箱粒剤





有効成分：フルピリミン・・・2.0% ペンフルフェン・・・2.0%
人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指すという通称）

- 初期害虫（イネミズゾウムシ、イネドロオウムシ）、ウンカ類、紋枯病に高い効果を発揮!!**
新規殺虫成分「フルピリミン」は、既存殺虫剤に感受性が低下した害虫種に対しても殺虫効果を示します。
また、殺菌成分「ペンフルフェン」が病原菌の菌糸伸長、孢子発芽、発芽管伸長、孢子形成などを強く阻害し、紋枯病に対して優れた効果を発揮します。
- 様々な施用方法が可能!!**
本剤は、育苗箱処理、移植時側条施用と様々な施用方法で使用できます。
- 新規殺虫成分「フルピリミン」は、ミツバチへの影響が小さい!!**
ミツバチのほか、多くの有用昆虫や天敵類に対して影響はほとんどありません。

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルピリミンを含む農薬の総使用回数	ペンフルフェンを含む農薬の総使用回数
稲	紋枯病 イネミズゾウムシ	1kg/10a	移植時	1回	側条施用	3回以内 （直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内）	1回
稲 （箱育苗）	紋枯病 イネミズゾウムシ イネドロオウムシ	育苗箱 （30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ） 1箱当り50g	は種時 （覆土前） ～移植当日		育苗箱の上から 均一に 散布する。	3回以内 （移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内）	
	ウンカ類		移植3日前 ～移植当日				

試験成績



リディアEV箱粒剤は各病害虫に対し、高い効果が認められた。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。
●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空袋は圃場や用水路などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌をつけましょう。

お問い合わせ/ご注文は



**三井化学クロップ&ライフ
ソリューション株式会社**

東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <https://www.mc-croplifesolutions.com>