

ザークD1キロ粒剤51 (第18445号)

2009年11月04日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ダイムンを含む農薬の総使用回数
移植 水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ ミズガヤツリ オモダカ クログワイ セリ ヒルムシロ コウキヤガラ (九州) アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植後5日～ ノビエ2.5葉期 ただし、移植 後30日まで	砂壤土～ 埴土	1 kg/10a	1回	湛水 散布	北陸、関東・ 東山・東海の 普通期及び 早期栽培地帯 近畿・中国・ 四国の 早期栽培地帯	3回以内 (育苗箱散布 は1回以内、 本田では2 回以内)
	移植後5日～ ノビエ3葉期 ただし、移植 後30日まで	近畿以西の 普通期栽培地 帯及び九州の 早期栽培地帯						
直播 水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ミズガヤツリ (近畿・中国・四国)	稲1葉期～ ノビエ2.5葉 期 ただし、収穫 90日前まで	壤土～ 埴土				北陸、近畿・ 中国・四国	2回以内
			砂壤土～ 埴土				九州	

ベンズルメチルを含む農薬の 総使用回数	メフェソトを含む農薬の 総使用回数
2回以内	2回以内