

コロマイト水和剤(第19656号)

2021年7月7日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミルベメクチンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ハダニ類 チャノホリダニ ミカンキジラミ	2000 倍	500～ 700L/10a	収穫 7 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内
	ミカンサビダニ	2000～ 3000 倍					
りんご	ハダニ類	2000 倍	400～ 700L/10a	収穫前日 まで	1 回		1 回
なし	ハダニ類 ニセサビダニ						
いちじく	ハダニ類		200～	収穫 7 日 前まで	2 回以内		2 回以内
ぶどう			700L/10a				
すいか			100～ 300L/10a	収穫前日 まで			
メロン							
きゅうり							
なす							
ふき							
いちご	シクラメンホリダニ						
食用ぎく	ハダニ類		100～ 200L/10a	発生初期	2 回以内		2 回以内
きく							
ばら							
りんどう				100～ 500L/10a			
げっきつ	シロギラミ		100～ 300L/10a				

作物名	適用場所	適用 病害虫名	使用量	使用 液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ミルベメクチンを含む農薬の 総使用回数
みかん	温室、ガラス 室等密閉で きる場所	ハダニ類	200g/10a	20L/10a	収穫7日 前まで	2回 以内	常温 煙霧	2回以内
大粒種 ぶどう			150g/10a	15L/10a				