

スタークルメイト液剤10（第21260号）1/2

2021年12月22日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジフエランを含む農薬の総使用回数			
稲	—	ウカ類	30倍	3L/10a	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)			
			16倍	1.6L/10a							
		ツマグロヨコバイ	1000倍	60~150L/10a			ウカ類 カメシ類		8倍	0.8L/10a	無人航空機による散布
			300倍	25L/10a							
		30倍	3L/10a	空中散布							
		だいこん	—	アブラムシ類			8~16倍		1.6L/10a	収穫7日前まで	2回以内
キャベツ	収穫3日前まで	3回以内 (育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)									
ブロッコリー	3回以内 (定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)										

2021年12月22日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメフランを含む農薬の総使用回数
ねぎ	—	アザミヤ類	10～16倍	1.6L/10a	収穫3日前まで	2回以内	無人航空機による散布	4回以内 (は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)
さとうきび		カンシャコハネカガメムシ 付コ類	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)
			14倍	2.4L/10a			無人航空機による散布	
だいず えだまめ		カメシ類 フタスジヒメムシ ダイズサヤマハエ	1000倍	100～300L/10a	2回以内	無人航空機による散布	散布	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
			8倍	0.8L/10a			空中散布	
らっきょう		アザミヤ類 ハモグリハエ類		1.6L/10a	収穫前日まで		無人航空機による散布	
いね科牧草		アブラムシ類		100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内		
水田作物、畑作物 (休耕田)		ヨシ、ギ、ススキ、セイカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメシ類	1000倍	60～150L/10a	—		散布