

トレボンスターフロアブル (第 22037 号)

2021 年 12 月 22 日現在

| 作物名 | 適用<br>病害虫名                                     | 希釈<br>倍数 | 使用<br>液量        | 使用時期           | 本剤の<br>使用回数 | 使用<br>方法           | エトフェンプロックス<br>を含む農薬の<br>総使用回数 | ジノテフランを<br>含む農薬の<br>総使用回数   |
|-----|--|----------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|
| 稲   | カメムシ類<br>ウンカ類<br>コブノメイガ<br>ツマグロヨコバイ<br>フタオビコヤガ | 1000 倍   | 60～<br>150L/10a | 収穫 14 日<br>前まで | 3 回以内       | 散布                 | 3 回以内                         | 4 回以内<br>(育苗箱へ<br>の処理及び<br>側条施用は<br>合計 1 回以<br>内、本田で<br>の散布、空<br>中散布、無<br>人航空機散<br>布は合計<br>3 回以内) |
|     | カメムシ類  | 300 倍    | 25L/10a         |                |             |                    |                               |   |
|     | カメムシ類<br>ウンカ類<br>コブノメイガ<br>ツマグロヨコバイ            |          |                 |                |             |                    |                               |   |
| だいず | カメムシ類  | 8 倍      | 0.8L/10a        |                | 2 回以内       | 無人航空<br>機による<br>散布 | 2 回以内                         | 3 回以内<br>(は種時の<br>土壌混和は<br>1 回以内、散<br>布、空中散<br>布、無人航<br>空機散布は<br>合計 2 回<br>以内)                    |