

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クワダリンを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数
にんじん	しみ腐病	30L/10a (1穴当り 3mL)	作付の 10~15 日前まで	1回	耕起整地後、30cm 間隔のフタリ状に 深さ約15cmに所 定量を注入し、直 ちに覆土し、ポリ エチレン、ビニール等で 被覆する。	1回	1回
ごぼう	ネグサセンチュウ ネコブセンチュウ	20~30L/10a (1穴当り 2~3mL)				2回以内 (床土1 回以内)	
	黒あざ病	30L/10a (1穴当り 3mL)				3回以内 (床土1 回以内、 圃場2回 以内)	
すいか	つる割病 黒点根腐病					20~30L/10a (1穴当り 2~3mL)	
	さやいんげん	ネグサセンチュウ ネコブセンチュウ					
メロン	黒点根腐病 えそ斑点病 つる割病	20~30L/10a (1穴当り 2~3mL)				2回以内 (床土1 回以内)	
	だいこん						
はくさい	ネグサセンチュウ ネコブセンチュウ	20~30L/10a (1穴当り 2~3mL)				2回以内 (床土1 回以内、 圃場1回 以内)	
	キャベツ						
未成熟そらまめ		苗立枯病 (リゾクトニア菌)				30L/10a (1穴当り 3mL)	
なす	ネグサセンチュウ ネコブセンチュウ	20~30L/10a (1穴当り 2~3mL)					
	トマト ミニトマト					青枯病	
きゅうり		萎凋病 ネグサセンチュウ ネコブセンチュウ				20~30L/10a (1穴当り 2~3mL)	
	ピーマン とうがらし類	青枯病					
かぼちゃ		つる割病 ホモプシ根腐病				20~30L/10a (1穴当り 2~3mL)	
	こまつな	立枯病					
レタス かぶ		ネグサセンチュウ ネコブセンチュウ				20~30L/10a (1穴当り 2~3mL)	
豆類 (未成熟、ただし、 さやいんげん、未 成熟そらまめ、さ やえんどう、実え んどうを除く)	1回						

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カルビクリンを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数
ほうれんそう	萎凋病	20～30L/10a (1穴当り 2～3mL)	作付の 10～15 日前まで	1回	耕起整地後、30cm 間隔のトリ状に 深さ約15cmに所 定量を注入し、直 ちに覆土し、ポリ エチレン、ビニール等で 被覆する。	2回以内 (床土1 回以内)	1回
しょうが	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
ばれいしょ	根茎腐敗病	30L/10a (1穴当り 3mL)					
	そうか病、青枯 病	20～30L/10a (1穴当り 2～3mL)					
かんしょ	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	30L/10a (1穴当り 3mL)					
さといも	立枯病	30L/10a (1穴当り 3mL)					
やまのいも	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L/10a (1穴当り 2～3mL)					
	根腐病 褐色腐敗病	30L/10a (1穴当り 3mL)					
いちご	炭疽病 萎黄病	20～30L/10a (1穴当り 2～3mL)					
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
こんにやく	根腐病	30L/10a (1穴当り 3mL)					
ねぎ	白絹病	20～30L/10a (1穴当り 2～3mL)					
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ						
さやえんどう 実えんどう みょうが(花穂) みょうが(茎葉) にがうり 葉しょうが	苗立枯病	30L/10a (1穴当り 3mL)					
オクラ	立枯病	20～30L/10a (1穴当り 2～3mL)					
パセリ	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	30L/10a (1穴当り 3mL)					
セルリー	萎黄病	20～30L/10a (1穴当り 2～3mL)					
	半身萎凋病						
きく	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	30L/10a (1穴当り 3mL)					
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L/10a (1穴当り 2～3mL)					
ストック	萎凋病	30L/10a (1穴当り 3mL)					
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L/10a (1穴当り 2～3mL)					
チューリップ	球根腐敗病	30L/10a (1穴当り 3mL)					
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L/10a (1穴当り 2～3mL)					
カーネーション	萎凋細菌病	30L/10a (1穴当り 3mL)					
	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L/10a (1穴当り 2～3mL)					
トルコギキョウ	根腐病、立枯病	30L/10a (1穴当り 3mL)					
花き類・観葉植物 (ストック、チューリップ、き く、カーネーション、トルコギ キョウを除く)	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20～30L/10a (1穴当り 2～3mL)					

2020年2月12日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クルビクリンを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数
たばこ	ネブセンチュウ立枯病	(畦内土壌注入) 1穴当たり2~3mL	作付の30日前まで	1回	(畦内土壌注入) 畦立後、畦中央の頂上から、30cm間隔で、35cmの深さに所定量を注入し、直ちに注入口をふさぎ、ポリエチレンビニール等で被覆する。	1回	1回

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	クルビクリンを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数
にんじん だいこん はくさい かぼちゃ ばれいしょ かんしょ さといも やまのいも こんにゃく オクラ パセリ 豆類 (未成熟、ただし、 さやいんげん、未 成熟そらまめ、さ やえんどう、実え んどうを除く)	一年生雑草	作付の 10~15日 前まで	20~30L/10a (1穴当たり 2~3mL)	1回	耕起整地 後、30cm間 隔のフドリ状 に深さ約 15cmに所定 量を注入し、直ちに 覆土し、ポリ エチレンビニール 等で被覆す る。	1回	1回
ごぼう なす ほうれんそう しょうが みょうが(花穂) みょうが(茎葉) にがうり 葉しょうが さやえんどう 実えんどう						2回以内 (床土1回 以内)	
すいか トマト ミニトマト きゅうり ピーマン とうがらし類 いちご ねぎ セルリー さやいんげん 花き類・観葉植物						3回以内 (床土1回 以内、圃場 2回以内)	
メロン キャベツ 未成熟そらまめ						2回以内 (床土1回 以内、圃場 1回以内)	