

MI CザーボックスDX 1キロ粒剤 (第22422号)

2009年7月22日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北、九州の早期) ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ (東北を除く) クログワイ (東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国) オモダカ (九州の早期を除く) ヒルムシロ (東北、北陸を除く) エゾノサヤヌカグサ (北海道) シズイ(東北) アオミドロ・藻類による表層はく離 (東北、北陸を除く)	移植後 20～30 日 (ノビエ 3.5 葉期まで)  [移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用]	砂壤土 ～ 埴土	1 kg /10a	1 回	湛水散布	全域(九州を除く)の普通期栽培地帯及び関東以西の早期栽培地帯
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ アオミドロ・藻類による表層はく離	稲 5 葉期～ノビエ 3.5 葉期まで 但し、 収穫 60 日前まで [は種後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用]					全域(九州を除く)

シロップブチルを含む農薬の総使用回数	シメリンを含む農薬の総使用回数	ベンフルセトを含む農薬の総使用回数	MCPB を含む農薬の総使用回数
3 回以内	2 回以内	2 回以内	2 回以内