

M I C ザーベックスSM粒剤 (第 2 2 4 2 3 号)

2011年5月11日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植 水 稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ ヒルムシロ エゾノサヤヌカグサ	移植後 20 日～ ノビエ 2.5 葉期 ただし、移植後 30 日まで	砂壤土～ 埴土	3 kg /10a	1 回	湛 水 散 布	北海道
	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ シズイ(東北)		壤土～ 埴土				東北 北陸
	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ オモダカ クログワイ		砂壤土～ 埴土				近畿・中国・ 四国の普通 期及び早期 栽培地帯 関東・東山・ 東海の普通 期及び早期 栽培地帯

シトルンを含む 農薬の総使用回数	ベンフルセトを含む 農薬の総使用回数	MCPB を含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内