

MI Cペンコゼブフロアブル (第22435号)

2022年8月3日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数
うめ	黒星病 かいよう病 すす斑病	1000倍	200～700 L/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
ぶどう	べと病 黒とう病 晩腐病 褐斑病			収穫45日前まで	2回以内		2回以内
きゅうり	べと病 炭疽病	500～1000倍	150～300 L/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
	褐斑病	500倍			2回以内		2回以内
トマト ミニトマト	疫病 葉かび病 輪紋病 すすかび病	1000倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内
メロン	べと病	500～600倍		収穫7日前まで	7回以内		7回以内
すいか	つる枯病 炭疽病	500倍 600倍	3回以内		3回以内		
キャベツ	べと病	500～600倍	収穫30日前まで	3回以内	3回以内		
ねぎ	黒斑病 さび病 べと病		収穫14日前まで				
実えんどう	褐紋病 褐斑病	500倍	100～300L /10a	収穫14日前まで	2回以内		2回以内
さやえんどう				収穫開始30日前まで			
きく	白さび病	800倍		発病前～発病初期	8回以内	8回以内	