

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
果樹類 (かんきつ、 パインを除く)	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a	3回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内		
		多年生雑草		500~1000 mL/10a						
かんきつ		一年生雑草		250~500 mL/10a				5回以内		
		多年生雑草		500~1000 mL/10a						
豆類 (種実、ただし、 だいず、らっかせい を除く)	—	一年生雑草	は種7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a、 5~15L/10a	2回 以内	雑草 茎葉 散布	2回以内		
だいず								は種後出芽前まで (雑草生育期)	通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a	2回 以内
								畦間処理： 雑草生育期 但し、収穫前日 まで		
えだまめ								は種7日前まで (雑草生育期)	通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a、 5~15L/10a	1回
小麦	—	多年生イネ科 雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	250~1000 mL/10a	通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a	3回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内		
		一年生雑草		は種後出芽前 (雑草生育期)					250~500 mL/10a	
		多年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	500~1000 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 5~15L/10a	1回				
	圃場 内の 周縁部	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250mL/10a	通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a	3回 以内				
麦類 (小麦を除く)	—	一年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 5~15L/10a	1回	雑草 茎葉 散布	2回以内		
は種後出芽前 (雑草生育期)			通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a							
かんしょ			耕起又は挿苗 7日前まで (雑草生育期)		通常散布 100L/10a 少量散布 5~15L/10a					

2021年10月13日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
野菜類 (えだまめ、キャベツ、はつかだいこん、だいこん、とうがらし類、にんじん、ピーマン、ねぎ、たまねぎ、アスパラガス、オリーブ(葉)、きゅうり、たらのき、トマト、なす、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス、薬用にんじん、豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)、かんしょを除く)	—	一年生雑草	耕起又は定植 7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a、 5~15L/10a	1回	雑草 茎葉 散布	1回
とうがらし類 にんじん ピーマン								2回以内
アスパラガス オリーブ(葉) きゅうり しゃくやく(薬用) たらのき トマト なす びわ(葉) ほうれんそう レタス								3回以内
薬用にんじん								10回以内 (1年間に 2回以内)
キャベツ			1回					
だいこん			2回以内					
はつかだいこん			1回					

2021年10月13日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
ねぎ たまねぎ	—	一年生雑草	耕起又は定植 7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a、 5~15L/10a	3回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
			定植後畦間処理 但し、収穫30日 前まで (雑草生育期)		通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a			
水田作物 (水稲を除く)			耕起20~10日前 (雑草生育期)		通常散布 100L/10a 少量散布 5~15L/10a			
移植水稲		多年生雑草	湛水前30~5日前 (雑草生育期) (不耕起栽培)	500~1000 mL/10a	50L/10a	1回		2回以内
			一年生雑草	耕起20~10日前 (雑草生育期)	250~500 mL/10a			
直播水稲		一年生雑草	耕起直後~ 出芽前 (雑草生育期)	250~1000 mL/10a	少量散布 25~50L/10a	2回 以内		2回以内
			多年生雑草	500 mL/10a	50L/10a			
		一年生雑草	は種30日前~ 出芽前 (雑草生育期)	250~1000 mL/10a	少量散布 25~50L/10a			
		多年生雑草	(乾田不耕起栽培)	500 mL/10a	50L/10a			
水田作物 (水田刈跡)		水田 刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250~500 mL/10a	通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a、 5~15L/10a		1回
	多年生雑草		500~1000 mL/10a					
水田作物 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 25L/10a	2回 以内	3回以内	
		多年生雑草		500~1000 mL/10a				
水田作物 畑作物 (休耕地)	休耕地	一年生雑草	雑草生育期	250~500 mL/10a	通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a、 5~15L/10a	2回 以内	3回以内	

2021年10月13日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
さとうきび (春植え)	—	一年生雑草	耕起10日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100L/10a	1回	雑草 茎葉 散布	6回以内
		多年生雑草		500~1000 mL/10a	少量散布 25~50L/10a、 5~15L/10a			
茶	—	一年生雑草	摘採7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	少量散布 25~50L/10a	4回 以内	雑草 茎葉 散布	2回以内
樹木類	—		雑草生育期		通常散布 50~100L/10a 少量散布 25~50L/10a			4回 以内
牧草	牧野、 草地 (更新・ 造成)	多年生雑草	更新・造成の 10日前まで (雑草生育期)	500~1000 mL/10a	通常散布 50L/10a 少量散布 5~15L/10a	2回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
		一年生及び 多年生雑草	は種10日前~ は種当日 (耕起整地後： 雑草発生揃期)	250~500 mL/10a	少量散布 25~50L/10a			
樹木等	公園、 庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地、 のり面、 鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	500mL/10a	通常散布 100L/10a 少量散布 25L/10a、 5~15L/10a	3回 以内	植栽 地を 除く 樹木 等の 周辺 地に 雑草 茎葉 散布	3回以内
		多年生雑草		1000 mL/10a				
		スギナ	生育盛期	2000 mL/10a	少量散布 25~50L/10a、 5~15L/10a			
林木	造林地 (地ごし らえ)	ススキ、 ササ類、 クズ等の 多年生雑草、 落葉雑かん木	生育盛期以降	1000 mL/10a	少量散布 20~30L/10a、 5~15L/10a	雑草 木 茎葉 散布		

2021年10月13日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
林木	林地	クズ	春期 又は 秋期	原液又は 2倍液	1~2mL/株	-	株頭注入 処理	-
樹木等	公園、庭園、 堤とう、駐車場、 道路、運動場、 宅地、のり面、 鉄道等	落葉 雑かん木	5~ 10月		1mL/ヶ所 樹径 ヶ所数 10cm以下 2~3 10~20cm 4~8 20cm以上 10		立木注入 処理	
		雑かん木	伐採 直後		切り口全体に 十分量を塗布		植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に切株 塗布処理	
林木 畑作物	林地 放置竹林 畑地	竹類	夏~ 秋期	原液	5~15mL/本		竹稈注入 処理	