

ランネート微粒剤F (第22599号)

2017年5月31日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 刈ミルを含む農薬の総使用回数 |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|------------|-------------------------|
| キャベツ | アオムシ、ヨウムシ ハスモンヨトウ | 3～5kg/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| | コナガ、タマギンウワバ アブラムシ類 | 4～6kg/10a | | | | |
| だいこん | アオムシ、ヨウムシ ハスモンヨトウ | 3～5kg/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | | 2回以内 (は種時の土壌混和は1回以内) |
| | コナガ、タマギンウワバ アブラムシ類 | 4～6kg/10a | | | | |
| かんしょ | ハスモンヨトウ エビガラスズメ イモコガ、ナジロシタハ | 3～5kg/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | | 5回以内 |
| | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | | | | |
| ばれいしょ | ヨウムシ | 3～5kg/10a | | | | |
| | アブラムシ類 | 4～6kg/10a | | | | |
| はくさい | ネリムシ類 | 6kg/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 地表面 散布 | 2回以内 (は種時の土壌混和は1回以内) |
| だいず | ハスモンヨトウ シロイモジ、マダラメカ カメムシ類 | 4～5kg/10a | | 4回以内 | | |
| にんじん (北海道に限る) | キタネコブセンチュウ | 20～30 kg/10a | は種前 | 1回 | 全面土壌 混和 | 2回以内 (は種前の土壌混和は1回以内) |