

アニキ乳剤（第22696号）（1/4）

2022年11月9日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	レピクチンを含 む農薬の 総使用回数	
みかん	ミカンモグリガ	1000～ 2000倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	4回 以内	散布	4回以内	
	チャノキイロアザミウマ アゲハ類	1000～ 4000倍						
	ミカンサビダニ	2000～ 4000倍						
	チャノホコリダニ	4000倍						
かんきつ (みかんを除く)	ミカンモグリガ	1000～ 2000倍		収穫3日 前まで				
	チャノキイロアザミウマ アゲハ類	1000～ 4000倍						
	ミカンサビダニ	2000～ 4000倍						
	チャノホコリダニ	4000倍						
未成熟 とうもろこし	オオタバコガ ツマジロウサヨトウ	1000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内	
	ハスモンヨトウ	2000倍						
ヤングコーン	オオタバコガ	1000倍						
だいず えだまめ	ハスモンヨトウ	2000～ 3000倍						
豆類(未成熟、た だし、えだまめ、 さやえんどうを 除く)		2000倍						
さやえんどう		ハモグリバエ類						1000倍
		オオタバコガ						1000～ 2000倍
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	2000～ 3000倍						
さといも	ハスモンヨトウ	2000倍						
いちご	オオタバコガ	1000～ 2000倍						
	オオタバコガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 トマトサビダニ	2000倍						
トマト ミニトマト	コナジラミ類 ミカンイロアザミウマ	1000～ 2000倍						

アニキ乳剤（第22696号）（2/4）

2022年11月9日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	レミクチンを含 む農薬の 総使用回数
ピーマン とうがらし類	コナジラミ類	1000～ 2000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内
	ハスモンヨトウ オオタバコガ チャホコリダニ	2000倍					
なす	ハスモンヨトウ コナジラミ類	1000～ 2000倍					
	オオタバコガ ハモグリバエ類 チャホコリダニ	2000倍					
きゅうり	コナジラミ類	1000倍					
	ハスモンヨトウ	2000倍					
すいか	オオタバコガ	1000倍					
メロン	ハモグリバエ類 コナジラミ類	2000倍		4回 以内	4回以内		
ほうれんそう セルリー	ハスモンヨトウ	1000～ 2000倍		収穫3日 前まで	3回 以内		3回以内
キャベツ	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハマダラメイト ウワバ類 オオタバコガ						
	シイモジヨトウ		2000倍				
はくさい	キジノミムシ ダイコンハムシ	1000倍					
	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハマダラメイト オオタバコガ カブラハバチ類	1000～ 2000倍					
ブロッコリー	コナガ ハスモンヨトウ アオムシ シイモジヨトウ	2000倍					
茎ブロッコリー	ハスモンヨトウ						

2022年11月9日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	レピクチンを含 む農薬の 総使用回数
カリフラワー	コナガ ハスモンヨトウ	1000～ 2000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内
非結球あぶらな 科葉菜類	コナガ ハスモンヨトウ キジノミハムシ ハモグリバエ類	1000～ 2000倍		収穫前日 まで			
レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ シイモジヨウ			収穫3日 前まで			
非結球レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ			収穫前日 まで			
アスパラガス	コナジラミ類	1000倍		収穫前日 まで			
たまねぎ	ハスモンヨトウ	2000倍					
	シイモジヨウ	1000～ 2000倍		収穫3日前 まで			
ねぎ	ネギコガ						
		ネギアザミウマ ハモグリバエ類		1000倍			
だいこん	コナガ アオムシ ハマダラメイト カブラハバチ類	1000～ 2000倍		収穫前日 まで			
かぶ	コナガ	1000倍					
		キジノミハムシ					
しそ(花穂)	ハスモンヨトウ	2000倍					
しそ科葉菜類 (しそを除く)							
しそ			シソサビダニ				
茶	チャノカクモンハマキ	1000～ 2000倍	200～400 L/10a	摘採7日 前まで	2回 以内		2回以内

2022年11月9日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	レピメチンを含 む農薬の 総使用回数
食用金魚草 食用なでしこ 食用プリムラ 食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんいちこう 食用トレニア 食用パンジー	ハスモンヨトウ	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
食用ぎく	オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000 倍		収穫 3 日前 まで			
きく(葉)	マハモクグリバエ	1000 倍					
きく	オオタバコガ ハスモンヨトウ	1000～ 2000 倍		発生初期	6 回 以内		6 回以内
カーネーション	オオタバコガ						
ストック	コナガ						
りんどう	リンゴウハハギ	2000 倍					