

ジェイソウルフロアブル (第24282号)

2019年10月9日現在

| 作物名          | 適用雑草名  | 使用時期  | 使用量       | 本剤の使用回数 | 使用方法  |
|--------------|--|---|-----------|---------|---|
| 移植<br>水<br>稲 | 一年生雑草<br>及び<br>マツバイ<br>ホタルイ<br>ヘラオモダカ<br>ミズガヤツリ<br>ウリカワ<br>オモダカ<br>ヒルムシロ<br>セリ<br>シズイ<br>エゾノサヤヌカグサ<br>アオミドロ・<br>藻類による表層はく離 | 移植時   | 500mL/10a | 1回      | 田植同時<br>散布機で<br>施用                          |
|              |  | 移植直後～<br>ノビエ 2.5 葉期<br>ただし、移植後 30 日<br>まで   |           |         | 原液湛水<br>散布、水<br>口施用又<br>は無人航<br>空機によ<br>る滴下 |
| 直播<br>水<br>稲 | 一年生雑草<br>及び<br>マツバイ<br>ホタルイ<br>ヘラオモダカ<br>ミズガヤツリ<br>ウリカワ<br>ヒルムシロ   | 稲 1 葉期～<br>ノビエ 2.5 葉期<br>ただし、収穫 90 日前<br>まで |           |         | 原液湛水<br>散布又は<br>無人航<br>空機によ<br>る滴下          |

|                        |                       |                        |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| シロピリレートを含む<br>農薬の総使用回数 | ピラゾレートを含む<br>農薬の総使用回数 | フェントサミドを含む<br>農薬の総使用回数 |
| 2回以内                   | 2回以内                  | 1回                     |