

農林水産省登録 第17764号

手軽にまける殺虫・殺菌混合剤

殺虫剤分類	3A
殺菌剤分類	16.1

コラトックス®トレボン®

有効成分 エトフェンブロックス…1.0% ピロキロン…5.0%

粒剤

手軽に
まける!!




大事なのは
守りかたです

いもち病と、ウンカ・ヨコバイ類の同時防除に!

特長

いもち病とウンカ類などに効果のある水稻本田散布剤です。
粒剤なので、周囲への飛散が少なく処理のしやすい薬剤です。



穂いもち



ツマグロヨコバイ



トビロウンカ



ヒメトビウンカ



ニカメイチュウ

コラトックスはシンジェンタ社の登録商標です。
トレボンは三井化学アグロ株式会社の登録商標です。



三井化学アグロ株式会社

三井化学
グループ

手軽にまける殺虫・殺菌混合剤

コラトックス®トレボン® 粒剤

(2018年9月26日現在)

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	ピロキロンを含む農薬の総使用回数
稲	ニカメイチュウ第1世代イナゴ類	4kg/10a	出穂 5日前まで	2回以内	散布	3回以内	3回以内 (直播での種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
	いもち病 ツマグロヨコバイ ウンカ類	3~4kg/10a					

同時防除のポイント

- いもち病の使用適期の範囲内で、害虫の発生に合わせて使用します。 ①
 - ツマグロヨコバイに対しては、成虫期～幼虫期のいずれのステージでも有効です。 ②
 - ヒメトビウンカ、セジロウンカ、トビイロウンカに対しては、成虫期よりも、幼虫期に使用すると高い防除効果が得られます。(ヒメトビウンカによる縞葉枯病など、ウイルス病防除を主にする場合は、6月中旬頃から本田に侵入する成虫期防除も高い効果が得られます。) ③
- ※初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関に相談してください。

初発10日前

初発

葉いもちと同時防除する場合

① 葉いもちの使用適期

② ツマグロヨコバイの成虫期～幼虫期

③ ウンカ類の幼虫期がより効果的。縞葉枯病防除には、ヒメトビウンカの成虫期(6月中旬～下旬)防除も有効

出穂30日前

出穂5日前

穂いもちと同時防除する場合

① 穂いもちの使用適期

② ツマグロヨコバイの成虫期～幼虫期

③ ウンカ類の幼虫期がより効果的

注意事項

- (1)使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- (2)本剤は湛水状態(湛水深3~5cm)でまきむらのないように均一に散布し、散布後少なくとも3~4日間はそのまま湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないように注意し、また散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。なお漏水の激しい水田では使用をさけてください。
- (3)本剤はいもち病防除を主体とするので、いもち病に対する使用適期を基準として使用してください。葉いもち防除は初発10日前～初発時に、また穂いもち防除は、出穂30日前～5日前に時期を失しないように散布してください。
- (4)蚕に対して長期間毒性があるので、絶対に桑葉にかからないようにしてください。
- (5)ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ①ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないがある場合には使用しないでください。

- ②関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- (6)イナゴ類に使用する場合には、本剤の散布適期は幼虫の本田侵入最盛期であることから遅れないように散布してください。
- (7)本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (8)散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、使用後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- (9)水産動植物(甲殻類、冷水魚)に影響を及ぼすので、河川、

- 養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池等周辺での使用はさけてください。
- (10)散布後は水管理に注意してください。
 - (11)散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
 - (12)直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けさせてください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。
- 防除日誌を記載しましょう。

*本製品は農業用殺虫殺菌であり、製品ラベルの記載以外には使用しないでください。

*本印刷物は2021年6月22日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

取扱



三井化学アグロ株式会社

東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <https://www.mitsui-agro.com/>